

【肺がん(外来)】

	当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	嘔吐性 リスク
1	lun001	肺-内;AMR(40mg/m)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 (製) カルセド注(規格なし):40mg/m Day1 Day2 Day3 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day3	中等度
2	lun002	肺-内;DTX(60mg/m)療法【3週毎】	ドセタセル60mg/m	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 ドセタセル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3	lun003	肺-内;CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDC/AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 ファミチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 パクリタキセル注(後発品「ネー」)規格なし):200mg/m Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 カキアブ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
4	lun004	肺-内;CBDCA+CPT-11療法【4週毎】	CBDC/AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 リリケ塩酸塩点滴静注液「ト」規格なし):60mg/m Day1 Day8 Day15 カキアブ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5	lun005	肺-内;CBDCA+VP-16療法【4週毎】	CBDC/AUC5	ソリアセトD輸液 500mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液「100mg「バド」」 100mg/5mL/V:100mg/m Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 カキアブ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day3	中等度 (特定)
6	lun006	肺-内;CBDCA+GEM療法【3週毎】	CBDC/AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m Day1 Day8 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 カキアブ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day8	中等度 (特定)
7	lun007	肺-内;CBDCA+PEM療法【3週毎】	CBDC/AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 カキアブ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
8	lun008	肺-内;Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDC/AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファミチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル注「ネー」(規格なし):200mg/m Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 カキアブ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)

9	lun009	肺-内;CBDCA(2AUC)+PTX(40mg/ml)+RT療法【毎週】	CBDCA;AUC2 【放射線併用】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フモチン静注 20mg/日新【希釈液不要】:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 パクリタキセル注「錠」(規格なし):40mg/ml Day1 加林*ア*チン点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度
10	lun010	肺-内;CBDCA+S-1療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 加林*ア*チン点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1	中等度 (特定)
11	lun011	肺-内;CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (薬) アブラキサン点滴静注用 100mg(特生物):100mg/ml Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加林*ア*チン点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	中等度 (特定)
12	lun012	肺-内;PEM療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
13	lun013	肺-内;PEM+CBDCA+Bmab療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 加林*ア*チン点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1	中等度 (特定)
14	lun014	肺-内;PEM+Bmab療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1	軽度
15	lun015	肺-内;Bmab療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
16	lun016	肺-内;CDDP+CPT-11療法【3週毎】	小細胞肺癌…IP療法のday8,15のCPT-11単独投与【2投1休】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 リナカニル酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):60mg/ml Day1 Day8	高度

17	lun021	肺-内;ニル*ル*療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプゾーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
18	lun023	肺-内;RAM+DTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 ト*ル*ル*点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/m Day1	軽度
19	lun024	肺-内;ハ*ル*ル*療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
20	lun025	肺-内;ハ*ル*ル*+CBDCA+PEM療法【3週毎】	day1:ハ*ル*ル*(200mg/body)、加*ル*ル* (AUC5)、ア*ル*ル*(500mg/m) ※4コース後、維持療法	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 加*ル*ル*点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	中等度 (特定)
21	lun026	肺-内;ハ*ル*ル*+PEM療法【3週毎】	【維持療法】day1:ハ*ル*ル*(200mg/body)、ア*ル*ル* (500mg/m) ※ハ*ル*ル*は導入療法と合わせて計35回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	軽度
22	lun027	肺-内;ハ*ル*ル*+CBDCA+PTX療法【3週毎】	【扁平】(day1)ハ*ル*ル* ア*:200mg/body,PTX:200mg/m,CBDCA:AUC6※最大4コース→維持療法へ(計35回)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フ*モ*チ*ン*静注20mg/日新【希釈液不要】:1A Day1 デキサト注射液3.3mg/mL/A:6A Day1 バクシタキセル注(後発品)※→規格なし):200mg/m Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加*ル*ル*点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
23	lun028	肺-内;ハ*ル*ル*+CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	【扁平】ハ*ル*ル*:200mg/body(day1),nab-PTX:100mg/ m(day1,8,15),CBDCA(AUC6)(day1)※最大4コース→維持 へ	生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊)ア*ラ*キ*ン*点滴静注用100mg(特生物):100mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加*ル*ル*点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	中等度 (特定)
24	lun029	肺-内;ア*ル*ル*療法【3週毎】	ア*ル*ル* 1200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)テ*ン*ト*ク*点滴静注1200mg Day1	最小度

25	lun030	肺-内;777"リス"マ" +Bmab+CBDCa+PTX療法【3週毎】	【非扁平】(day1)777 777":1200mg/body,Bmab:15mg/kg,PTX:175mg/ ml,CBDCa:AUC6※最大4-6J-入→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バツグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フアモチジン静注20mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:6A Day1 バクワキセル注「紅い」(規格なし):175mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加糖777点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 アバシチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 (緊) テセントリク点滴静注1200mg Day1	中等度 (特定)
26	lun031	肺-内;777"リス"マ" +Bmab療法【3週毎】	【非扁平】(day1)777":1200mg/body,Bmab:15mg/kg, ※導入療法4-6J-入後の維持療法	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバシチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 (緊) テセントリク点滴静注1200mg Day1	最小度
27	lun032	肺-内;777"リス"マ" +CBDCa+VP-16療法【3週毎】	【ED-SCLC】(day1)777 777":1200mg/body,CBDCa:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/ml※4J-入→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バツグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg[カト] 100mg/5mL/V:100mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加糖777点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 (緊) テセントリク点滴静注1200mg Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3	中等度 (特定)
28	lun033	肺-内;777"リス"マ"療法【2週毎】	【地固め療法】デュルバルマブ(day1) 10mg/kg ※投与 期間は、初回投与から12ヶ月間まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフィンジ注(規格なし):10mg/kg Day1	最小度