

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性/スク
1 uro001	泌;DTX(70mg/m <sup>2</sup> )+PSL療法【3週毎】	DTX 70mg/m <sup>2</sup> ,PSL 10mg/day連日内服	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トキサート点滴静注液「ニプロ」(規格なし):70mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度に 準じる
2 uro002	泌;尿路上皮癌_GEM単独療法【3投1休】【4週毎】	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用「NKJ」(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
3 uro003	泌;テムシロム(トーセル)療法【毎週】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) トーセル点滴静注液25mg(溶解液付):25mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
4 uro009	泌;前立腺癌_CBZ+PSL療法【3週毎】	CBZ 25mg/m <sup>2</sup> ,PSL 10mg/day連日内服	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ファモジン静注 20mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 (緊) ジェブタ点滴静注 60mg:25mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
5 uro011	泌;腎癌_ニキルマ療法【2週毎】	ニキルマ 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
6 uro012	泌;尿路上皮癌_GEM+CBDC療法【3週毎】	CBDC(AUC:5) day1,GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1,8	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラセトロン点滴静注パツグ 1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用「NKJ」(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 加林アチ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 uro013	泌;尿路上皮癌_ハムリス療法【3週毎】	ハムリス 200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
8 uro014	泌;腎癌_ニキルマ+化リム療法【3週毎】	ニキルマ 240mg/body,化リム 1mg/kg 併用投与期間は3週毎49%、その後ニキルマ単独へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (緊) ヤーホ点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):30ml Day1	最小度
9 uro016	泌;腎癌_ハムリス+7チン療法【3週毎】	ハムリス 200mg/body day1,7チン 1回5mg1日2回連日 **ハムリスは最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度

10	uro017	泌;精巣腫瘍_CPT-11+NDP療法【4週毎】	CPT-11 200-300mg/m <sup>2</sup> +NDP 100mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 仰/加塩酸塩点滴静注液[ト-リ](規格なし):300mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (紫) アクアラ静注用(規格なし):100mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	中等度 (特定)
11	uro018	泌;尿路上皮癌_7 <sup>α</sup> 7 <sup>β</sup> 療法【2週毎】	7 <sup>α</sup> 7 <sup>β</sup> 10mg/kg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (紫) バベンチオ点滴静注 200mg/10mL:10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
12	uro019	泌;尿路上皮癌_1 <sup>α</sup> 1 <sup>β</sup> 療法【4週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (紫) バトセブ点滴静注 30mg:1.25mg/kg Day1 Day8 Day15 注射用水フソ-20mL:1A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15	軽度