

【食道がん(外来)】

最終更新令和4年8月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 eso003	食道-外;Low doseFP療法	5日連続2日休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン注 10mg/20mL/V[日医工](後発品):10mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラル注「トワ」 250mg/5mL/V (後発):500mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	高度
2 eso005	外科.食道癌 weekly PTX100mg/m ² 【6投1休】	weekly PTX 100mg/m ² day1,8,15,22,29,36【49日で1コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 グラセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファミチン静注 20mg[日新](希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル静注「レルー」(規格なし):100mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	中等度に 準ずる
3 eso006	食道-外;ニホ [®] 療法【2週毎】	ニホ [®] 240mg/body ※2次治療以降に導入を検討	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
4 eso008	食道-外;FOLFOX療法【2週毎】	※CDDP不耐例に対し本治療を考慮、最新のガイドラインを確認!!	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ニホ [®] 点滴静注用 (規格なし) :200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラル注 (規格なし) :400mg/ml Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロウラル注 (規格なし) :2400mg/ml Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
5 eso011	食道-内;DTX療法【3週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 トワ [®] 点滴静注液「ニプロ」 (規格なし) :70mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) :1本 Day1	軽度