

【肝臓がん・胆道がん・膵臓癌(外来)】

最終更新令和4年2月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 liv001	肝胆膵-内;胆道癌CDDP+GEM療法【3週毎】	シタラキ25mg/m ² +ゲムシタリン1000mg/m ² day1,8 21日休	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 シスプラチン注「日医工」(規格なし)(後発品):25mg/m ² Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ゲムシタリン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	中等度(特定)に準ずる
2 liv002	肝胆膵-内;膵癌nabPTX+GEM療法【4週毎】	nab-PTX 125mg/m ² +ゲムシタリン1000mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊)アブラキサン点滴静注用 100mg(特生物):125mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタリン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
3 liv003	肝胆膵-外;GEM+S-1療法【1投1休】【2週毎】	GEM(1投1休)、S-1(day1~7内服、day8~14休薬)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ゲムシタリン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
4 liv004	肝胆膵-外;胆道癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタリン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 liv005	肝胆膵-外;膵癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタリン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
6 liv006	肝胆膵-外;膵癌FOLFIRINOX療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 フルオロウラシル点滴静注「カ」0.75mg/50mL「外研」(70粒後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリリチン塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):180mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	高度
7 liv009	肝胆膵-外;膵癌RAM療法【2週毎】	サイラムザ8mg/kg ★AFP400ng/mL以上であること、Child-Pugh分類Aであること確認★	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
8 liv010	肝胆膵-外;膵癌GS療法【3週毎】	GEM(day1,8),S-1(2投1休)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 ゲムシタリン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	軽度

9	liv011	肝胆腫-外; 肝癌ホド+FF療法【2週毎】	二次治療以降の使用であること。	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセトロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 (薬) オニバイド点滴静注43mg:70mg/ml Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 生食注 50mL点滴静注用 (規格なし) :200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/ml Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)
10	liv012	肝-外; アテゾニチニブ + Bmab療法【3週毎】	【切除不能な肝細胞癌】 (day1)アテゾニチニブ:1200mg/body, Bmab:15mg/kg, ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (薬) テセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバスタチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
11	liv013	肝胆腫-内; 肝癌_modifiedFOLFIRINOX療法【2週毎】	PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パロチニド点滴静注(0.75mg/50mL[針なし]) (7時以後発) :1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL点滴静注用 (規格なし) :200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トリファン塩酸塩点滴静注液(150mg/ml) (規格なし) :150mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/ml Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	高度