

【乳がん(外来)】

最終更新令和4年8月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 bre001	乳-外;【固定量】肺転移VNR+Tmab療法【3週毎】	VNR 30mg/body (day1, 8) HER 100mg/body (毎週)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 ロゼウス静注液10mg/1mL/V:3V Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):100mg Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 Day8 Day15	最小度
2 bre002	乳-外;【固定量】PTX療法【毎週】	PTX;100mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ファミジン静注 2.0mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :100mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
3 bre003	乳-外;DTX(70mg/m) 療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 トセトロン点滴静注「ニプロ」 (規格なし) :70mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
4 bre004	乳-外;PTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファミジン静注 2.0mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :175mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度に 準ずる
5 bre005	乳-外;FEC療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パクリタキセル点滴静注「バグ」0.75mg/50mL「バグ」(70分後発) :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 エドキシリン塩酸塩注射液(規格なし):100mg/m Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):500mg/m Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :500mg/m Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	高度
6 bre006	乳-外;VNR(20mg/m) 療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):20mg/m Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8	最小度
7 bre007	乳-外;【初回-1】PTX+Tmab(4mg/kg)療法【毎週】	PTX (day1) ; 80mg/m. HER (day1) ; 4mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ファミジン静注 2.0mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :80mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
8 bre008	乳-外;【2回以降】PTX+Tmab(2mg/kg)療法【毎週】	PTX (day1) : 80mg/m. HER (day1) : 2mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ファミジン静注 2.0mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :80mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):2mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
9 bre009	乳-外;PTX療法(3投1休)療法【4週毎】	day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ファミジン静注 2.0mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :80mg/m Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に 準ずる

10	bre010	乳-外;nabPTX療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1            デキサト注射液3.3mg/mL/A:3A Day1            (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):260mg/mi Day1            生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	中等度に 準ずる
11	bre011	乳-外;【初】-入]PTX(175)+Tmab(8)療法【3週毎】	PTX175mg/mi+HER8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1            デキサト注射液3.3mg/mL/A:6A Day1            ファモチジン静注20mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1            パクリタキセル静注【針なし】(規格なし):175mg/mi Day1            5%ブドウ糖注500mL(シフト):1本 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用[ NK](規格なし):8mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に 準ずる
12	bre012	乳-外;【2】-入以降]PTX(175)+Tmab(6)療法【3週毎】	PTX175mg/mi+HER6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラネセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1            デキサト注射液3.3mg/mL/A:6A Day1            ファモチジン静注20mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1            パクリタキセル静注【針なし】(規格なし):175mg/mi Day1            5%ブドウ糖注500mL(シフト):1本 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用[ NK](規格なし):6mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に 準ずる
13	bre013	乳-外;AC療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            B<sup>12</sup>/f<sup>12</sup>点滴静注用0.75mg/50mL[針なし] (70分後発):1本 Day1            デキサト注射液3.3mg/mL/A:3A Day1            ドキソルビシン塩酸塩注(規格なし):60mg/mi Day1            生食注 100mL (針なし):1本 Day1            エドキシサン注(規格なし):600mg/mi Day1            生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	高度
14	bre014	乳-外;Bmab(10mg/kg)+PTX(90mg/mi)療法【4週毎】	Bmab10mg/kg (day1,15) +PTX90mg/mi (day1,8,15)	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15            アスチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15            生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day15            デキサト注射液3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15            ファモチジン静注20mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15            生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15            パクリタキセル静注【針なし】(規格なし):90mg/mi Day1 Day8 Day15            5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15</p>	軽度
15	bre015	乳-外;I/A <sup>1</sup> 療法(1投1休)【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1            生食注 50mL (針なし):1本 Day1            (緊) ハラヴェン静注1mg/2mL/V:1.4mg/mi Day1            生食注 50mL (針なし):25ml Day1</p>	軽度
16	bre016	乳-外;I/A <sup>2</sup> 療法(2投1休)【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8            デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8            生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8            (緊) ハラヴェン静注1mg/2mL/V:1.4mg/mi Day1 Day8            生食注 50mL (針なし):25ml Day1 Day8</p>	軽度
17	bre017	乳-外;【初】-入]Tmab療法【3週毎】	HER 8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用[ NK](規格なし):8mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
18	bre018	乳-外;【2】-入以降]Tmab療法【3週毎】	HER 6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用[ NK](規格なし):6mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度

19	bre019	乳-外;【初回-1】 <sup>Λ</sup> 「リヌマ」 <sup>Λ</sup> +Tmab+DTX療法【3週毎】	ル <sup>Λ</sup> -α <sup>Λ</sup> 19840mg/body、ル-β <sup>Λ</sup> 78mg/kg、ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 60mg/m <sup>2</sup> ※ル <sup>Λ</sup> -α <sup>Λ</sup> 19前回投与より6週以上の間隔を確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) パーシタ点滴静注 420mg/1.4mL:840mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
20	bre020	乳-外;【2回以降】 <sup>Λ</sup> 「リヌマ」 <sup>Λ</sup> +Tmab+DTX療法【3週毎】	ル <sup>Λ</sup> -α <sup>Λ</sup> 19420mg/body、ル-β <sup>Λ</sup> 76mg/kg、ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) パーシタ点滴静注 420mg/1.4mL:420mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
21	bre021	乳-外;TDM1療法【3週毎】	カドサイラ3.6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) カドサイラ点滴静注用(規格なし):3.6mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
22	bre022	乳-外;【初回-1】DTX+Tmab療法【3週毎】	ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 、ル-β <sup>Λ</sup> 78mg/kg、3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 点滴静注液「ニプロ」(規格なし):75mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
23	bre023	乳-外;【2回以降】DTX+Tmab療法【3週毎】	ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 75mg/m <sup>2</sup> 、ル-β <sup>Λ</sup> 76mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 点滴静注液「ニプロ」(規格なし):75mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
24	bre024	乳-外;TC(DTX+CPA)療法【3週毎】	★FN高リスク	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グリセトロン点滴静注「ツグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ド <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> セ <sup>Λ</sup> 点滴静注液「ニプロ」(規格なし):75mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度
25	bre025	乳-外;【初回-1】nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週)療法	【4週毎】nabPTX: day1,8,15 HER: day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):4mg/kg Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):2mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
26	bre026	乳-外;【2回以降】nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週)療法	【4週毎】nabPTX: day1,8,15 HER: day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
27	bre027	乳-外;nabPTX(3投1休)療法【4週毎】	nab-PTX 100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度

28	bre028	乳-外;【初回-1】IIP*リ+Tmab療法【3週毎】	ハバカイン(day1,8) : 1.4mg/m <sup>2</sup> 、HER (day1) : 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 (緊) ハラヴェン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用「NKJ(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
29	bre029	乳-外;【2回-以降】IIP*リ+Tmab療法【3週毎】	ハバカイン(day1,8) : 1.4mg/m <sup>2</sup> 、HER (day1) : 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 (緊) ハラヴェン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用「NKJ(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
30	bre030	乳-外;アテゾリズマブ* + nabPTX療法【4週毎】	アテゾリズマブ:840mg/body (day1,15) ,nab-PTX: 100mg/m <sup>2</sup> (day1,8,15)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊) アブレキサ点点滴静注用 100mg (特生物) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊) デセントリク点滴静注840mg:840mg Day1 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
31	bre031	乳-外;A*ム*リ*マ* + GEM+CBDC療法【3週毎】	※PDまで(A*ム*リ*マ*)は計35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 (緊) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 ギムシタピン点滴静注用「NKJ(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 加味ア*リ*点滴静注用「日医工」(規格なし) :0mg/A Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL (シフト) :1本 Day8	中等度に準ずる
32	bre032	乳-外;トラスツズマブ* デ*ル*カカ(エンハーリ)療法【3週毎】	トラスツズマブ* デ*ル*カカ5.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HKJ」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 (緊)エンハーリ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B :1本 Day1	中等度(特定)