

【頭頸部がん(外来)】

最終更新令和3年4月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 hea002	頭頸部-耳;DTX(70mg/m ²)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ドパドポイント静注液「ニプロ」(規格なし):70mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
2 hea008	頭頸部-耳;【2回-1目-】PTX+Cmab療法【毎週】	Cmab 400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)、PTX 80mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (薬) アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ファミジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル静注「ネビト」(規格なし):80mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
3 hea009	頭頸部-耳;【1回-1目】Cmab療法【毎週】	初回(400mg/m ²)、放射線併用	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (薬) アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:400mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
4 hea010	頭頸部-耳;【2回-1目】Cmab療法【毎週】	2回目以降(250mg/m ²)、放射線併用	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (薬) アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
5 hea012	頭頸部-耳;ニボルマブ療法【2週毎】	ニボルマブ 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
6 hea016	頭頸部-歯;パドポイント療法【3週毎】	パドポイント 200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (薬) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
7 hea017	頭頸部-歯;CBDCA+RT療法【毎週】	CBDCA 75mg/m ² ※放射線治療を開始してから終了まで、週1回投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 加藤アポイント点滴静注「日医工」(規格なし):75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる