

【乳がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 bre002	乳-外;【固定量】PTX療法【毎週】	PTX;100mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フアモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):100mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
2 bre003	乳-外;DTX(70mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 トラスツズマブ点滴静注(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 bre004	乳-外;PTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度に 準ずる
4 bre005	乳-外;FEC療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パクリタキセル点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(70分後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 エリルピリン塩酸塩注射液(規格なし):100mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	高度
5 bre006	乳-外;VNR(20mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):20mg/mi Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8	最小度
6 bre007	乳-外;【初回-1】PTX+Tmab(4mg/kg)療法【毎週】	PTX(day1);80mg/mi,HER(day1);4mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フアモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
7 bre008	乳-外;【2回以降】PTX+Tmab(2mg/kg)療法【毎週】	PTX(day1):80mg/mi,HER(day1):2mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フアモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):2mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
8 bre009	乳-外;PTX療法(3投1休)療法【4週毎】	day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フアモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に 準ずる
9 bre010	乳-外;nabPTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アブキサン点滴静注用 100mg(特生物):260mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度に 準ずる

10	bre011	乳-外;【初】-λ PTX(175)+Tmab(8)療法【3週毎】	PTX175mg/m ² +HER8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモチジン静注 20mg(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/m² Day1 5%ブドウ糖注 500mL(シフト):1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に準ずる
11	bre012	乳-外;【2】-λ以降 PTX(175)+Tmab(6)療法【3週毎】	PTX175mg/m ² +HER6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモチジン静注 20mg(希釈液不要):1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/m² Day1 5%ブドウ糖注 500mL(シフト):1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に準ずる
12	bre013	乳-外;AC療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パクリタキセル点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(70分後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ドキソルビシン塩酸塩注(規格なし):60mg/m² Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m² Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	高度
13	bre014	乳-外;Bmab(10mg/kg)+PTX(90mg/m ²)療法【4週毎】	Bmab10mg/kg(day1,15)+PTX90mg/m ² (day1,8,15)	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 アリチン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フアモチジン静注 20mg(希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):90mg/m² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15</p>	軽度
14	bre015	乳-外;IA療法(1投1休)【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ハロゲン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m² Day1 生食注 50mL(針なし):25ml Day1</p>	軽度
15	bre016	乳-外;IA療法(2投1休)【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 ハロゲン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m² Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):25ml Day1 Day8</p>	軽度
16	bre017	乳-外;【初】-λ Tmab療法【3週毎】	HER 8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
17	bre018	乳-外;【2】-λ以降 Tmab療法【3週毎】	HER 6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
18	bre019	乳-外;【初】-λ 1775+Tmab+DTX療法【3週毎】	1775 840mg/body、1775 8mg/kg、ドキシタキセル 60mg/m ² ※1775 1ヶ月前投与より6週以上の間隔を確認	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル点滴静注 420mg/14mL:840mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ドキシタキセル点滴静注液(規格なし):60mg/m² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1</p>	軽度

19	bre020	乳-外;【2]-以降】 [△] 「リツマ」+Tmab+DTX療法【3週毎】	ル [△] →1:420mg/body、ル [△] 7:6mg/kg、ド [△] 7:6mg/2	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 パージエタ点滴静注 420mg / 14mL:420mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド [△] 7:6mg点滴静注液(規格なし):60mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
20	bre021	乳-外;TDM1療法【3週毎】	カドサイラ3.6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 カドサイラ点滴静注用(規格なし):3.6mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
21	bre022	乳-外;【初]-入】DTX+Tmab療法【3週毎】	ド [△] 7:6mg/75mg/mi、ル [△] 7:8mg/kg、3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド [△] 7:6mg点滴静注液(規格なし):75mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
22	bre023	乳-外;【2]-以降】DTX+Tmab療法【3週毎】	ド [△] 7:6mg/75mg/m2、ル [△] 7:6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ド [△] 7:6mg点滴静注液(規格なし):75mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
23	bre024	乳-外;TC(DTX+CPA)療法【3週毎】	★FN高リスク	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(バッグ) 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ド [△] 7:6mg点滴静注液(規格なし):75mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度
24	bre025	乳-外;【初]-入】nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週)療法	【4週毎】nabPTX: day1,8,15 HER: day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):4mg/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):2mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
25	bre026	乳-外;【2]-以降】nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週)療法	【4週毎】nabPTX: day1,8,15 HER: day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 トラスツズマブBS点滴静注用(規格なし):2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
26	bre027	乳-外;nabPTX(3投1休)療法【4週毎】	nab-PTX 100mg/mi day1,8,15 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度

27	bre028	乳-外;【初回-1】EP+Tmab療法【3週毎】	EP(day1,8) : 1.4mg/m ² , HER (day1) : 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 ハラゲン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m ² Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツマブBS点滴静注用「NKJ(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
28	bre029	乳-外;【2回以降】EP+Tmab療法【3週毎】	EP(day1,8) : 1.4mg/m ² , HER (day1) : 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 ハラゲン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m ² Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツマブBS点滴静注用「NKJ(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
29	bre030	乳-外;アブリクスマブ+nabPTX療法【4週毎】	アブリクスマブ:840mg/body (day1,15), nab-PTX:100mg/m ² (day1,8,15)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バッグ」1mg/50mL:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アブリクスマブ点滴静注用 100mg (特生物) :100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 テセントリク点滴静注840mg:840mg Day1 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
30	bre031	乳-外;A ¹ EP+GEM+CBDCA療法【3週毎】	※PDまで(A ¹ EPは計35回まで)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注「バッグ」1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 加味アブリクスマブ点滴静注液(規格なし) :AUC=2 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) :1本 Day8	中等度に準ずる
31	bre032	乳-外;トラスツマブEP療法【3週毎】	トラスツマブ EP療法5.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ハラゲン点滴静注「バッグ」1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
32	bre033	乳-外;A ¹ EP+PTX療法【12週ごと】	A ¹ EP day1,22,43,64 PTXday1,8,15,29,36,43,57,64,71 ※PDまで(A ¹ EPは計35回まで)	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 Day22 Day43 Day64 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day22 Day43 Day64 バクリタキセル静注(規格なし) :90mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 グラニセロン点滴静注「バッグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 アブリクスマブ点滴静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	中等度に準ずる
33	bre034	乳-外-入;CBDCA+PTX療法【4週毎】	[adjuvant]※6回まで、CBDCA(AUC=2)	生食注 500mL/袋(点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バッグ」1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 アブリクスマブ点滴静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 バクリタキセル静注(規格なし) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加味アブリクスマブ点滴静注液(規格なし) :AUC=2 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
34	bre035	乳-外;【術前①】A ¹ EP+CBDCA+PTX療法	[neoadjuvant]【3週毎】※4回 →【術前②】A ¹ EP+AC/EC療法へ	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :3本 Day1 グラニセロン点滴静注「バッグ」1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 アブリクスマブ点滴静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 バクリタキセル静注(規格なし) :80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:2袋 Day1 Day8 Day15 加味アブリクスマブ点滴静注液(規格なし) :AUC=2 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
35	bre036	乳-外;【術前②】A ¹ EP+AC療法【3週毎】	[neoadjuvant]※4回→【術後③】A ¹ EP療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ハラゲン点滴静注「バッグ」0.75mg/50mL(70μg後発) :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 ドキシリジン塩酸塩注(規格なし):60mg/m ² Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	高度

36	bre037	乳-外;【術後③】A°Δ°01A°マ°療法【3週毎】	[adjuvant(計9回)] ※術前補助療法 (A°Δ°01A°マ°+化学療法後) に実施	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
37	bre038	乳-外;トロチルビ療法【3週毎】	タキサン系抗悪性腫瘍剤による治療歴がある患者を対象とすること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1,8 ファモチジン静注 20mg:1A Day1,8 デキサード注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1,8 トロチルビ点滴静注:10mg/kg Day1,8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8 生食注 50mL:1本 Day1,8	中等度に準ずる