

【肺がん(外来)】

最終更新令和6年12月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 lun001	肺-内;AMR(40mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 カルセド注(規格なし):40mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3	中等度
2 lun002	肺-内;DTX(60mg/mi)療法【3週毎】	ドセタセル60mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ドセタセル点滴静注液(規格なし):60mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 lun003	肺-内;CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フアモジジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
4 lun004	肺-内;CBDCA+CPT-11療法【4週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 傾/加塩酸塩点滴静注液(規格なし):60mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5 lun005	肺-内;CBDCA+VP-16療法【4週毎】	CBDCA;AUC5	ソリアセトD輸液 500mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3 エトポシド点滴静注液100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
6 lun006	肺-内;CBDCA+GEM療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 lun007	肺-内;CBDCA+PEM療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
8 lun008	肺-内;Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモジジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル注(規格なし):200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
9 lun009	肺-内;CBDCA(AUC2)+PTX(40mg/mi)+RT療法【毎週】	CBDCA;AUC2【放射線併用】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 フアモジジン静注 20mg[希釈液不要]:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 パクリタキセル注(規格なし):40mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 加味アミノ点滴静注液(規格なし):AUC=2 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度

10	lun010	肺-内;CBDCA+S-1療法【3週毎】	CBDCA;AUC5 S-1;day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 加味アラジ点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度 (特定)
11	lun011	肺-内;CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg(特生物):100mg/ml Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味アラジ点滴静注液(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1</p>	中等度 (特定)
12	lun012	肺-内;PEM療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	軽度
13	lun013	肺-内;PEM+CBDCA+Bmab療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 加味アラジ点滴静注液(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 ベバシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	中等度 (特定)
14	lun014	肺-内;PEM+Bmab療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 ベバシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	軽度
15	lun015	肺-内;Bmab療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベバシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	最小度
16	lun016	肺-内;CDDP+CPT-11療法【3週毎】	小細胞肺癌…IP療法の日8,15のCPT-11単独投与【2投1休】	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 仰/加塩酸塩点滴静注液(規格なし):60mg/ml Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8</p>	高度
17	lun021	肺-内;ニルルマ療法【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1</p>	最小度
18	lun022	肺-内;NGT療法【3週毎】	小細胞肺癌	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3 ハイカムチン注射用 1.1mg:1mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>	軽度

19	lun023	肺-内;RAM+DTX療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 トセビル点滴静注液(規格なし):60mg/m Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	軽度
20	lun024	肺-内;A°Δ7°叫入°7°療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	最小度
21	lun025	肺-内;A°Δ7°叫入°7°+CBDCA+PEM療法【3週毎】	day1:A°Δ7°叫入°7°(200mg/body)、加林°ア°7°(AUC5)、アムタ°(500mg/m) ※4コース後、維持療法	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 加林°ア°7°点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1</p>	中等度 (特定)
22	lun026	肺-内;A°Δ7°叫入°7°+PEM療法【3週毎】	【維持療法】day1:A°Δ7°叫入°7°(200mg/body)、アムタ°(500mg/m) ※A°Δ7°叫入°7°は導入療法と合わせて計35回	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	軽度
23	lun028	肺-内;A°Δ7°叫入°7°+CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	【扁平】A°Δ7°叫入°7°:200mg/body(day1),nab-PTX:100mg/m(day1,8,15),CBDCA(AUC6)(day1)※最大4コース→維持へ	<p>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加林°ア°7°点滴静注液(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15</p>	中等度 (特定)
24	lun029	肺-内;ア°7°叫入°7°療法【3週毎】	【進行再発NSCLC】【NSCLC adjuvant】【ED-SCLCの維持療法】	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	最小度
25	lun030	肺-内;ア°7°叫入°7°+Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】	【非扁平】(day1)ア°7°:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,PTX:175mg/m,CBDCA:AUC6※最大4-6コース→維持療法へ	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 アプタキサン点滴静注 200mg(希釈液不要):1A Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 バクシケル注(規格なし):175mg/m Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加林°ア°7°点滴静注液(規格なし):AUC=6 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度 (特定)
26	lun031	肺-内;ア°7°叫入°7°+Bmab療法【3週毎】	【非扁平】(day1)ア°7°:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,※導入療法4-6コース後の維持療法	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	最小度
27	lun032	肺-内;ア°7°叫入°7°+CBDCA+VP-16療法【3週毎】	【ED-SCLC】(day1)ア°7°:1200mg/body,CBDCA:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/m※4コース→維持療法へ	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 テセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イトボンド点滴静注液100mg/5mL/V:100mg/m Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加林°ア°7°点滴静注液(規格なし):AUC=5Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day3</p>	中等度 (特定)

28	lun034	肺-内;テ`1M`ル7`* + CBDCA+VP-16療法【3週毎】	【ED-SCLC】(day1)テ`1M`ル7`*:1500mg/body,CBDCA:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/mi※41-ス→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg/5mL/V:100mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加糖ア`7`点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3	中等度 (特定)
29	lun035	肺-内;テ`1M`ル7`* 1500療法【4週毎】	【進行再発NSCLC】【ED-SCLCの維持療法】	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1	最小度
30	lun037	肺-内;RAM+EGFR-TKI療法【2週毎】	RAM 10mg/kg,EGFR-TKI(各々の添付文書どおり)※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1	最小度
31	lun040	肺-内;二`ル7`* + 化`リム7`療法【6週毎】	【NSCLC】【悪性中皮腫】day1,2二`ル7`* 360mg/body,day1 化`リム7` 1mg/kg※PDまで、二`ル7`、化`リム7`は最長2年間まで投与可	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):30ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 オブジーホ注(規格なし):360mg Day1 Day22 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day22	最小度
32	lun041	肺-内;二`ル7`* 480療法【4週毎】	(day1)二`ル7`* 480mg※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーホ注(規格なし):480mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
33	lun043	肺-内;(short) `ル7`* + CDDP+GEM療法【3週毎】	【扁平】※最大41-ス→維持療法(`ル7`* 単独)へ ★年齢、PS、腎機能、心機能、1L/日以上以上の飲水可能を確認。	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ボートラーザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8 生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 バ`0`点滴静注液`7` 0.75mg/50mL(7日抄後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1250mg/ml Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 シスプラチン注(規格なし)(後発品):75mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 フロセド注 20mg/2mL/A:1A Day1 20%マンニトールS注射液「YD」 300mL:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	高度
34	lun044	肺-内;`ル7`* 維持療法【3週毎】	※`ル7`* + CDDP + GEM療法41-ス後の維持療法、PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 (繁)ボートラーザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8 生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8	最小度
35	lun046	肺-内;nabPTX療法【3週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg(特生物):100mg/ml Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度

36	lun047	肺-内;アタリ"ル" + CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	【非扁平】※最大4-6i-ス→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味アタリ点滴静注液 (規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 テセントリク点滴静注:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	中等度 (特定)
37	lun048	肺-内;VNR(2投1休)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):25mg/mi Day1 Day8	最小度
38	lun049	肺-内;トシリムマ" + テ"111"ル" + CBDCA+nabPTX療法	【非扁平】※最大4-6i-ス→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):4本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味アタリ点滴静注液 (規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イジユド点滴静注 25mg/1. 25mL:75mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
39	lun050	肺-内;トシリムマ" + テ"111"ル" + CBDCA+PEM療法	【3週毎】【非扁平】※4コース→トシリムマ" + テ"111"ル" ±PEM療法へ	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ベトレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):2本 Day1 加味アタリ点滴静注液 (規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イジユド点滴静注 25mg/1. 25mL:75mg Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1	中等度 (特定)
40	lun051	肺-内;トシリムマ" + テ"111"ル"療法	トシリムマ" + テ"111"ル"療法1コース投与→テ"111"ル" 1500療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 Day29 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 Day29 生食注 50mL (針なし):1本 Day29 イジユド点滴静注 25mg/1. 25mL:75mg Day29 生食注 100mL (針なし):1本 Day29	最小度
41	lun052	肺-内;トシリムマ" + テ"111"ル" + PEM療法	【非扁平】※トシリムマ" + テ"111"ル" ±PEM療法1コース投与→テ"111"ル" ±PEM療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day29 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 生食注 50mL (針なし):3本 Day29 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day29 ベトレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/mi Day1 Day29 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day29 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 Day29 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day29 イジユド点滴静注 25mg/1. 25mL:75mg Day29 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day29	軽度
42	lun053	肺-内;テ"111"ル" + PEM療法【4週毎】	【非扁平】※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 ベトレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1	最小度
43	lun054	肺-呼外;【術前】ニホ"ル" + CBDCA+PTX療法【3週毎】	【非小細胞】(day1)ニホ"ル":360mg/body,PTX:200mg/mi,CBDCA:AUC6※最大3i-ス	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 ファモチジン静注 20mg【希釈液不要】:1A Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 パクリタキセル静注 (規格なし):200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用):1本 Day1 加味アタリ点滴静注液 (規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 オブジーホ注(規格なし):360mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
44	lun055	肺-呼外;【術前】ニホ"ル" + CBDCA+PEM療法【3週毎】	【非小細胞】(day1)ニホ"ル":360mg/body,PEM:500mg/mi,CBDCA:AUC5※最大3i-ス	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ベトレキセド点滴静注液:500mg/mi Day1 生食注 100mL/袋 (点滴用):1本 Day1 加味アタリ点滴静注液 (規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 オブジーホ注(規格なし):360mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
45	lun56	肺-内;肺癌GEM (3投1休)療法【4週毎】	【非小細胞】(day1. 8. 15)GEM:1000mg/mi※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8,15 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1,8,15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1,8,15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1,8,15 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/mi Day1,8,15	最小度

46	lun60	肺;【21-1目】【体重80kg未満】アミルンタマ [®] +CBDCA+PEM療法【3週毎】	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんであること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ペムレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生食注 100mL:1本 Day1 加麻 [®] ア [®] 点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ライブリント点滴静注液:1400mg Day1 生食注250mL/袋:1袋 Day1	中等度
47	lun61	肺;【3-41-1目】【体重80kg未満】アミルンタマ [®] +CBDCA+PEM療法【3週毎】	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんであること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ペムレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生食注 100mL:1本 Day1 加麻 [®] ア [®] 点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ライブリント点滴静注液:1750mg Day1 生食注250mL/袋:1袋 Day1	中等度
48	lun62	肺;【51-1目以降】【体重80kg未満】アミルンタマ [®] +PEM療法【3週毎】	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんであること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注50mL:1本 Day1 ペムレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生食注 100mL:1本 Day1 ライブリント点滴静注液:1750mg Day1 生食注250mL/袋:1袋 Day1	中等度
49	lun64	肺;【21-1目】【体重80kg以上】アミルンタマ [®] +CBDCA+PEM療法【3週毎】	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんであること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ペムレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生食注 100mL:1本 Day1 加麻 [®] ア [®] 点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ライブリント点滴静注液:1750mg Day1 生食注250mL/袋:1袋 Day1	中等度
50	lun65	肺;【3-41-1目】【体重80kg以上】アミルンタマ [®] +CBDCA+PEM療法【3週毎】	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんであること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ペムレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生食注 100mL:1本 Day1 加麻 [®] ア [®] 点滴静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 ライブリント点滴静注液:2100mg Day1 生食注250mL/袋:1袋 Day1	中等度
51	lun66	肺;【51-1目以降】【体重80kg以上】アミルンタマ [®] +PEM療法【3週毎】	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺がんであること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注50mL:1本 Day1 ペムレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生食注 100mL:1本 Day1 ライブリント点滴静注液:2100mg Day1 生食注250mL/袋:1袋 Day1	軽度