

【大腸がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 col001	大腸-内;Pmab療法【2週毎】	パニマラブ：6mg/kg 2週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ペクテビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
2 col002	大腸-内;CPT-11療法【2週毎】	CPT-11 150mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 リノリカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注500mL(シフト):1本 Day1	中等度 (特定)
3 col003	大腸-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	1ヶ-14日間【day1,15,29...】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レキソト点点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
4 col004	大腸-外;mFOLFOX6+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レキソト点点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
5 col005	大腸-外;mFOLFOX6+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)ペクテビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レキソト点点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
6 col007	大腸-外;【2ヶ-1目】mFOLFOX6+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 アーピタックス注射液100mg/20mL/V:250mg/m ² Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レキソト点点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度
7 col008	大腸-外;FOLFIRI療法【2週毎】	1ヶ-14日間【day1,15,29...】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 リノリカ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 レキソト点点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
8 col009	大腸-外;FOLFIRI+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 リノリカ塩酸塩点滴静注液「SUN」(規格なし):150mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 レキソト点点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)

9	col010	大腸-外;FOLFIRI+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ヘクテビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/mi Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
10	col012	大腸-外;【2ヶ-目】FOLFIRI+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 アーピタックス注射液100mg/20mL/V:250mg/mi Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
11	col013	大腸-外;FOLFIRI+RAM療法【2週毎】	day1 RAM 8mg/kg,,CTP-11 150mg/m2,5-FU 400mg/m2,5FU 2400mg/m2	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
12	col014	大腸-外;FOLFIRI+ｶﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ｶﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ(規格なし):4mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ点滴静注用(規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
13	col015	大腸-外;XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
14	col016	大腸-外;XELOX(CapeOX)+Bmab療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｲﾍﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
15	col018	大腸-外;SOX+Bmab療法【3週毎】	S-1:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｲﾍﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1	中等度
16	col019	大腸-外;ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ+Bmab療法【4週毎】	ｲﾝﾌﾙｲｶﾞ5mg/kg (day1、15) ｲﾝﾌﾙｲｶﾞday1-5,8-12	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 ｲﾍﾞｼｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15	中等度

17	col022	大腸-外;肝転移WHF+CDDP療法【weekly】	★肝動脈注 CDDP (20mg/body) + 5-FU (1000mg/m2)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 シスプラチン注(規格なし):20mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 フルオロウラル注 (規格なし):1000mg/m Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用):1本 Day1	中等度に 準ずる
18	col023	大腸-外;5FU/LV療法	【1サイクル56日間6投2休】 day1,8,15,22,29,36 5FU600mg/m2, LV250mg/m2 【アミノ酸】は全3サイクル	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):250mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラル注 (規格なし):600mg/m Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1	軽度
19	col025	大腸-外;【②-】Cmab+レキソト+オキザリブチン療法【毎週】	Cmab 250mg/m day1,レキソト 1回300mg1日1回連日, レキソト 1回45mg1日2回連日	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アピタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/m Day1	軽度
20	col026	大腸-外;★Cmab+レキソト+オキザリブチン療法【2週毎】	Cmab 500mg/m day1,レキソト 1回300mg1日1回連日, レキソト 1回45mg1日2回連日 ※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アピタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/m Day1	軽度
21	col027	大腸-外;FOLFIRI+Cmab500療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること ※PDまで	生食注 250mL/袋:3袋 Day1 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アピタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/m Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):150mg/m Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):200mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオロウラル注 (規格なし):400mg/m Day1 フルオロウラル注 (規格なし):2400mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
22	col028	大腸-外;mFOLFOX6+Cmab500療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アピタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/m Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):85mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:2本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):200mg/m Day1 フルオロウラル注 (規格なし):400mg/m Day1 フルオロウラル注 (規格なし):2400mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
23	col029	大腸-外;【1-1目】Cmab+XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8,15 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1,2A Day8,15 アピタックス点滴静注用:400mg/m Day1,250mg/m Day8,15 生食注 250mL (針なし):1本 Day1,8,15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1	中等度
24	col030	大腸-外;【2-1目以降】Cmab+XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	生食注 250mL/袋:1袋 Day1,8,15 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1,2A Day8,15 アピタックス点滴静注用:250mg/m Day1,8,15 生食注 250mL (針なし):1本 Day1,8,15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/m Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1	中等度
25	col031	大腸-外;CPT-11+Pmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)ベクテイビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 レキソト点滴静注液(規格なし):150mg/m Day1 生食注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)