

## 【婦人科がん(外来)】

最終更新令和6年12月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 gyn001	婦;TC療法【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1 加味アフラピ点静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
2 gyn002	婦;TC+Bmab療法【2-6J-λ】【4週毎】	CBDC(AUC:5),PTX 175mg/mi,Bmab 15mg/kg【最大6J-λ目まで】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注20mg【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL(ソフト):1本 Day1 加味アフラピ点静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
3 gyn003	婦;Bmab単剤療法【7-22J-λ】【4週毎】	Bmab 15mg/kg【最大22J-λ目まで】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
4 gyn004	婦;卵巣癌_DC療法【1J-λ】【4週毎】	CBDC(AUC:5),DTX 70mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドセタキセル点滴静注液(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 加味アフラピ点静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5 gyn005	婦;卵巣癌_DC+Bmab療法【2-6J-λ】【4週毎】	CBDC(AUC:5),DTX 70mg/mi,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL【HK】:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドセタキセル点滴静注液【2J】(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 加味アフラピ点静注液【日医工】(規格なし):0mg/A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
6 gyn007	婦;卵巣癌_ddTC療法【4週毎】	CBDC(AUC:5) day1,PTX 80mg/mi day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フモチジン静注20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day8 Day15 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加味アフラピ点静注液(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 gyn008	婦;卵巣癌_ddTC+Bmab療法【4週毎】	CBDC(AUC:5) day1,PTX 80mg/mi day1,8,15,Bmab 15mg/kg day1	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フモチジン静注20mg【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day8 Day15 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル静注(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 加味アフラピ点静注液(規格なし):0mg/A Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
8 gyn010	婦;卵巣癌_PLD+CBDC+A+Bmab療法【4週毎】	PLD(ドセタキセル) 30mg/mi, CBDC(AUC:5), Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ドキシル注20mg/100mL:30mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 加味アフラピ点静注液(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度 (特定)

9	gyn012	婦;PLD単剤療法【4週毎】	PLD(ト*抄丸) 40mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 トキシル注 20mg/10mL:40mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
10	gyn013	婦;PLD+Bmab療法【3週毎】	PLD(ト*抄丸) 30mg/m <sup>2</sup> ,Bmab 15mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トキシル注 20mg/10mL:30mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	軽度
11	gyn014	婦;GEM単独療法【3投1休】【4週毎】	GEM 1000mg/m <sup>2</sup> day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
12	gyn015	婦;卵巣癌_GEM+Bmab療法【3週毎】	Bmab 15mg/kg,GEM 1000mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8	軽度
13	gyn020	婦;絨毛性疾患_EP療法【4週毎】	CBDC 250mg/m <sup>2</sup> day1,VP-16 100mg/m <sup>2</sup> day1,3,5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day3 Day5 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day3 Day5 生食注 50mL (針なし):1本 Day3 Day5 加味アバスタチン点滴静注用(規格なし):250mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イトボンド点滴静注液100mg/5mL:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day3 Day5 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day3 Day5	中等度 (特定)
14	gyn021	婦;臨床的侵入奇胎_WeeklyMTX(筋注)【毎週】	MTX 50mg/m <sup>2</sup>	メソリキセート注(規格なし 通常療法):50mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用水フソ-20ml:1A Day1	最小度
15	gyn023	婦;子宮肉腫-婦;(short) AP (ADM+CDDP)療法【3週毎】	ADM 60mg/m <sup>2</sup> CDDP 50mg/m <sup>2</sup> 目安;6コ-ス 65歳≧ADM60mg/m <sup>2</sup> .65歳<ADM45mg/m <sup>2</sup>	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 パロチン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(70抄後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 トキシルビシリン塩酸塩注(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day1 ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 フロセミド注 20mg/2mL/A:1A Day1 20%マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	高度
16	gyn024	婦;侵入奇胎_アチマイシンD/L療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 コスメゲン静注用 0.5mg:1.25mg/m <sup>2</sup> Day1 注射用水フソ-20ml:1A Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度
17	gyn025	婦;子宮体癌_△△△△△+△△△△△療法【3週毎】	△△△△△ 200mg/body day1,△△△△△ 1回20mg1日1回連日 ※PDまで **△△△△△は最大35回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルー点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度

18	gyn026	婦;子宮頸癌_ア°ム°叫ス°マ°+TC+Bmab療法【3週毎】	※最大6コース→維持療法(ア°ム°叫ス°マ°+Bmab) (ア°ム°叫ス°マ°は計35回まで)	生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファミチン静注 2.0mg[日新][希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注「北レ」(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1 加味ア°マ°点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 キトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	中等度 (特定)
19	gyn027	婦;子宮頸癌_ア°ム°叫ス°マ°+Bmab療法【3週毎】	【維持療法】ア°ム°叫ス°マ°+TC+Bmab療法 最大6コース後に実施。(ア°ム°叫ス°マ°は導入療法と合わせて計35回)	生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 キトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
20	gyn028	婦;子宮頸癌-セミアリマブ療法【3週毎】	セミアリマブ 350mg/body ※PDまで	生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1 リパヨ点滴静注用350mg/7mL:350mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
21	gyn29	婦-子宮体癌;ア°ム°叫ス°マ°+TC+カ°ル°リ°療法【1-6コース】【3週毎】	・新たに診断された進行または再発子宮体癌 ・再発の場合は手術による治癒の可能性は低く、術後補助化学療法最終投与から1年以上経過している場合	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファミチン静注 2.0mg:1A Day1 イミフンジ点滴静注用:1120mg/mi Day1 生食注 250mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル注:175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味ア°マ°点滴静注液:AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
22	gyn30	婦-子宮体癌;ア°ム°叫ス°マ°+TC+カ°ル°リ°療法【7-8コース】【維持療法】【4週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフンジ点滴静注用:1500mg/mi Day1 生食注 250mL(針なし):1本 Day1	最小度
23	gyn32	婦-子宮体癌;ア°ム°叫ス°マ°+TC療法【3週毎】	化学療法歴がない進行・再発の子宮体癌※最大6コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注パツグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 ファミチン静注 2.0mg:1A Day1 キトルーダ点滴静注用:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 パクリタキセル注:175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味ア°マ°点滴静注液:AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
24	gyn33	婦-子宮体癌;ア°ム°叫ス°マ°400療法【6週毎】	※最大14コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キトルーダ点滴静注用:400mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度