

【肝臓がん・胆道がん・膵臓癌(外来)】

最終更新令和6年12月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 liv001	肝胆腫-内;胆道癌CDDP+GEM療法【3週毎】	シタラビド25mg/m ² +ゲムシタビン1000mg/m ² day1,8 21日まで1回	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 シスプラチン注(規格なし)(後発品):25mg/m ² Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	中等度 (特定)に 準ずる
2 liv002	肝胆腫-内;膵癌nabPTX+GEM療法【4週毎】	nab-PTX 125mg/m ² +ゲムシタビン1000mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラネセロン点滴静注バッグ1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg(特生物):125mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	中等度に 準ずる
3 liv003	肝胆腫-外;GEM+S-1療法【1投1休】【2週毎】	GEM(1投1休)、S-1(day1~7内服、day8~14休薬)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	軽度
4 liv004	肝胆腫-外;胆道癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 liv005	肝胆腫-外;膵癌GEM療法【4週毎】	3投1休	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
6 liv006	肝胆腫-外;膵癌FOLFIRINOX療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 FOLFIRINOX点滴静注バッグ0.75mg/50mL(70抄後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注用(規格なし):85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリリチン点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリリチン塩酸塩点滴静注用(規格なし):180mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イリリチン点滴静注用(規格なし):200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注(規格なし):400mg/m ² Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):2400mg/m ² Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	高度
7 liv009	肝胆腫-外;膵癌RAM療法【2週毎】	サリシド 8mg/kg ★AFP400ng/mL以上であること、Child-Pugh分類Aであること確認★	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (紫)サイラムザ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
8 liv010	肝胆腫-外;膵癌GS療法【3週毎】	GEM(day1,8),S-1(2投1休)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 500mL(針なし):1本 Day1 Day8 ゲムシタビン点滴静注用(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8	軽度

9	liv011	肝胆腫-外; 肺癌 ¹ + FF療法【2週毎】	二次治療以降の使用であること。	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセロン点滴静注(7g/50mL):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 オニバイド点滴静注43mg/70mg/ri Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 1 st リナト点滴静注用(規格なし):200mg/ri Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/ri Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
10	liv012	肝-外; 777 ¹ + Bmab療法【3週毎】	【切除不能な肝細胞癌】 (day1)777 ¹ :1200mg/body, Bmab:15mg/kg, ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg:1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
11	liv013	肝胆腫-内; 肺癌 ¹ _modifiedFOLFIRINOX療法【2週毎】	PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 1 st リナト点滴静注用(規格なし):200mg/ri Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/ri Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 1 st リナト点滴静注用(規格なし):200mg/ri Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 1 st リナト塩酸塩点滴静注液(規格なし):150mg/ri Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注(規格なし):2400mg/ri Day1 生食注 100mL(針なし):100ml Day1	高度
12	liv015	肝胆腫-外; 胆道癌 ¹ + GC療法【3週毎】	※8コース投与後→777 ¹ 1500療法へ	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/ri Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/ri Day1 Day8 生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	高度
13	liv016	胆管腫-外; 777 ¹ 1500療法【4週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
14	liv017	肝胆腫-外; 1 st リナト ¹ 療法【1-2週目】	肝癌、1 st リナト ¹ 療法1コース投与 →777 ¹ 1500療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イジド点滴静注300mg/15mL:300mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
15	liv018	肝胆腫-外; 胆道癌 ¹ + GC療法【3週毎】	※8コース投与後→777 ¹ + GEM療法へ	生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1,8 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1,8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1,8 キイトルーダ点滴静注用100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/ri Day1,8 生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1,8 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/ri Day1,8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1,8 生食注 500mL/袋:1袋 Day1,8	高度
16	liv019	肝胆腫-外; 胆道癌 ¹ + GEM療法【3週毎】	※Pembro: 最大35コースまで、GEM: PDまで ※Pembro+GC療法⑧コース後	生食注 250mL/袋(点滴用):1本 Day1,8 デキサト注射液3.3mg/mL/A:2A Day1,8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1,8 キイトルーダ点滴静注用100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 ゲムシタピン点滴静注用(規格なし):1000mg/ri Day1,8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1,8	軽度