

【乳がん(外来)】

最終更新令和4年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名:数量 投与日	嚥吐性 リスク
1 bre002	乳-外;【固定量】PTX療法【毎週】	PTX;100mg/body	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(ワグ 1mg / 50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:3A Day1 ファモチジン静注 2.0mg[「日新」[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-ト」(規格なし) :100mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
2 bre003	乳-外;DTX(70mg/mi) 療法【3週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ドセトロン点滴静注液(「プロ」(規格なし) :70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 bre004	乳-外;PTX療法【3週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(ワグ 1mg / 50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 2.0mg[「日新」[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-ト」(規格なし) :175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソト) :1本 Day1	中等度に 準ずる
4 bre005	乳-外;FEC療法【3週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 パロセトロン点滴静注「カガ」0.75mg/50mL「タキ」(アロジ後発) :1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:3A Day1 エピレビン+塩酸塩注射液(規格なし):100mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 250mL /袋:1袋 Day1 フルロウラシル注 (規格なし) :500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	高度
5 bre006	乳-外;VNR(20mg/mi) 療法【3週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):20mg/mi Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8	最小度
6 bre007	乳-外;【初】PTX+Tmab(4mg/kg)療法【毎週】	PTX (day1) ; 80mg/mi, HER (day1) ; 4mg/kg	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(ワグ 1mg / 50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:3A Day1 ファモチジン静注 2.0mg[「日新」[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-ト」(規格なし) :80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL /袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
7 bre008	乳-外;【2】-以降】PTX+Tmab(2mg/kg)療法【毎週】	PTX (day1) : 80mg/mi, HER (day1) : 2mg/kg	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(ワグ 1mg / 50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:3A Day1 ファモチジン静注 2.0mg[「日新」[希釈液不要]:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-ト」(規格なし) :80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):2mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL /袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
8 bre009	乳-外;PTX療法(3投1休)療法【4週毎】	day1,8,15	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グニセトロン点滴静注(ワグ 1mg / 50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注 2.0mg[「日新」[希釈液不要]:1A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注「ホスピ-ト」(規格なし) :80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に 準ずる
9 bre010	乳-外;nabPTX療法【3週毎】		生食注 250mL /袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注(ワグ 1mg / 50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg /mL/A:3A Day1 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物) :260mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	中等度に 準ずる

10	bre011	乳-外;【初】PTX(175)+Tmab(8)療法【3週毎】	PTX175mg/mi+HER8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 2.0mg「日新」「希釈液不要」:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-」(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 トラスツズマブ点滴静注用「NKJ」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に準する
11	bre012	乳-外;【2】-以降】PTX(175)+Tmab(6)療法【3週毎】	PTX175mg/mi+HER6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:6A Day1 ファモチジン静注 2.0mg「日新」「希釈液不要」:1A Day1 パクリタキセル静注「ホスピ-」(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1 トラスツズマブ点滴静注用「NKJ」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に準する
12	bre013	乳-外;AC療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パルセトロン点滴静注「ホスピ-」0.75mg/50mL「タキ」(ホキ後発):1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 ドキソルビシン塩酸塩注(規格なし):60mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	高度
13	bre014	乳-外;Bmab(10mg/kg)+PTX(90mg/mi)療法【4週毎】	Bmab10mg/kg (day1,15) +PTX90mg/mi (day1,8,15)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 アバチソン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注 2.0mg「日新」「希釈液不要」:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注「ホスピ-」(規格なし):90mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	軽度
14	bre015	乳-外;エリザリン療法(1投1休)【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (繁) ハラエン静注1mg/2mL/V:1.4mg/mi Day1 生食注 50mL(針なし):25ml Day1	軽度
15	bre016	乳-外;エリザリン療法(2投1休)【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 (繁) ハラエン静注1mg/2mL/V:1.4mg/mi Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):25ml Day1 Day8	軽度
16	bre017	乳-外;【初】-Tmab療法【3週毎】	HER 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブ点滴静注用「NKJ」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
17	bre018	乳-外;【2】-以降】Tmab療法【3週毎】	HER 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブ点滴静注用「NKJ」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
18	bre019	乳-外;【初】-ハーツマブ+Tmab+DTX療法【3週毎】	ハーツマブ840mg/body、ハーベン8mg/kg、ドセタセル60mg/m2 ※ハーベン前回投与より6週以上の間隔を確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 (繁) ハーベン点滴静注4.20mg/1.4mL:840mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブ点滴静注用「NKJ」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ドセタセル点滴静注液「プロ」(規格なし):60mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度

19	bre020	乳-外;【2】-1以降】ペルツマム+Tmab+DTX療法 【3週毎】	ペルツマム420mg/body. ハセキン6mg/kg. ドセキセル 60mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (緊) バージタ点滴静注420mg/14mL:420mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ドセキセル点滴静注液「ニブロ」(規格なし):60mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
20	bre021	乳-外;TDM1療法【3週毎】	カドサイラ3.6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (緊) カドサイラ点滴静注用(規格なし):3.6mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
21	bre022	乳-外;【初】-1】DTX+Tmab療法【3週毎】	ドセキセル75mg/m ² 、ハセキン8mg/kg、3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ドセキセル点滴静注液「ニブロ」(規格なし):75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
22	bre023	乳-外;【2】-1以降】DTX+Tmab療法【3週毎】	ドセキセル75mg/m ² 、ハセキン6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ドセキセル点滴静注液「ニブロ」(規格なし):75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
23	bre024	乳-外;TC(DTX+CPA)療法【3週毎】	★FN高リスク	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトン点滴静注(ワグ1mg/50mL/HK):1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 ドセキセル点滴静注液「ニブロ」(規格なし):75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 エンドキサン(規格なし):600mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	中等度
24	bre025	乳-外;【初】-1】nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週) 療法	【4週毎】nabPTX : day1,8,15 HER : day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アラキサン点滴静注用100mg (特生物):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):4mg/kg Day1 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):2mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
25	bre026	乳-外;【2】-1以降】nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週) 療法		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アラキサン点滴静注用100mg (特生物):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
26	bre027	乳-外;nabPTX(3投1休)療法【4週毎】	nab-PTX 100mg/m ² day1,8,15 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アラキサン点滴静注用100mg (特生物):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
27	bre028	乳-外;【初】-1】イリザリン+Tmab療法【3週毎】	ハセキン(day1,8) : 1.4mg/m ² 、HER (day1) : 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 (緊) ハラヴン静注1mg/g/2mL/V:1.4mg/m ² Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスズマブ5S点滴静注用[NKJ](規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度

28	bre029	乳-外;【2】-入以降】エリザリソ+Trmab療法【3週毎】	トラマブ(day1,8) : 1.4mg/mi, HER (day1) : 6mg/kg	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 (緊) ハラベン静注1mg / 2mL/V:1.4mg/mi Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用「NKL」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL /袋:1袋 Day1	軽度
29	bre030	乳-外;アテリズマブ+nabPTX療法【4週毎】	アテリズマブ:840mg/body (day1,15) ,nab-PTX:100mg/mi(day1,8,15)	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グランセトロン点滴静注(ワグ1mg / 50mL/HK):1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊) アブラサン点滴静注用 100mg (特生物) :100mg/mi Day1 Day15 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊) テセントリ点滴静注840mg:840mg Day1 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
30	bre031	乳-外;^ムジリズマブ+GEM+CBDCA療法【3週毎】	※PDまで(^ムジリズマブは計35回まで)	生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 (緊) キトトーラ点滴静注 100mg / 4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 グランセトロン点滴静注(ワグ1mg / 50mL/HK):1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 ゲムシビン点滴静注用「NKL」(規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 加味アラジン点滴静注液「日医工」(規格なし) :0mg/A Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) :1本 Day8	中等度に準ずる
31	bre032	乳-外;トラスツズマブ テルクスチン(エル-リ)療法【3週毎】	トラスツズマブ テルクスチン5.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 グランセトロン点滴静注(ワグ1mg / 50mL/HK):1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 (緊) エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
32	bre034	乳-外-入;CBDCA+PTX療法【4週毎】	[adjuvant]※6J-入まで、CBDCA(AUC=2)	生食注 500mL /袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 グランセトロン点滴静注(ワグ1mg / 50mL/HK):1本 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注 20mg 「日新」[希釗液不要]:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 バクリタキセル静注「ホスピ-」(規格なし) :80mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 250mL /袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加味アラジン点滴静注液「日医工」(規格なし) :0mg/A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる