

【血液腫瘍(外来)】

最終更新令和4年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 blo001	血液-内;MDS/AML_アザチオチン(ヒダラ-ザ)皮下療法	5-2-2[28日間]※PDまで 制吐剤としてアザチオチン投与前にヒダラ70.1mg錠を服用 【MDS】 他の抗悪性腫瘍剤との併用は、有効性及び安全性は確立していない。 【AML:ベネトクラクスとの併用療法の場合】 *ベネトクラクス(ベネレクスタ)1日1回食後の連日投与	(紫) ビダラザ注射用 1 0 0 mg :75mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水フゾン20m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9	中等度
2 blo002	血液-内;APL_ATO療法(寛解導入後)[25回]	三酸化二砒素0.15mg/kg.5週間の間に1日1回計25回	生食注250mL/袋(点滴用) : 1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 トピレックス注10mg 10mg/10mL/A 0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 250mL/袋 : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	中等度であるが、 制吐剤なしで対応
3 blo024	血液-内;NHL_R-THP-COP療法【3週毎】	※最大83-1まで アトリンをday3-7に服用	生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) : 1本 Day1 ソル・コナテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/㎡ Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/㎡ Day1 生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) : 1本 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day3 オンゴピン注 1 mg/V:1.4mg/㎡ Day3 生食注 2 0 mL / A :1A Day3 ピルビン注射用(規格なし):50mg/㎡ Day3 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL / B :1本 Day3 エンドキサン注(規格なし):750mg/㎡ Day3 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day3	高度
4 blo025	血液-内;NHL_THP-COP療法【3週毎】	※最大83-1まで アトリンをday1-5に服用	生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) : 1本 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day1 オンゴピン注 1 mg/V:1.4mg/㎡ Day1 生食注 2 0 mL / A :1A Day1 ピルビン注射用(規格なし):50mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL / B :1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):750mg/㎡ Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1	高度
5 blo026	血液-内;NHL_RB療法【4週毎】	day1リツキシマブ375mg/㎡ day2,3アザチオチン90mg/㎡【4週毎】	生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) : 1本 Day1 ソル・コナテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/㎡ Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/㎡ Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day2 Day3 グラネセトロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3 : 3 mg/mL/A:3A Day2 Day3 トリアキシン点滴静注液100mg/4ml:90mg/㎡ Day2 Day3 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day2 Day3	中等度
6 blo028	血液-内;HL_ABVD療法	THP25mg/㎡+BLM10mg/㎡+VBL6mg/㎡+DTIC375mg/㎡	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3 : 3 mg/mL/A:3A Day1 ピルビン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(7日以後発) :1本 Day1 ピルビン注射用(規格なし):25mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL / B :1本 Day1 (紫) プレオ注射用15 mg :10mg/㎡ Day1 生食注 2 0 mL / A :1A Day1 イクザール注 1 0 mg/V:6mg/㎡ Day1 生食注 2 0 mL / A :1A Day1 (口産) ガルバシ注用 1 0 0 mg/V:375mg/㎡ Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 mL/B:1本 Day1	高度
7 blo032	血液-内;ATLL_ヒダラザ(ヒダラザ)療法【毎週】	ヒダラザ 1mg/kg	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 ソル・コナテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 (紫) ポテリジオ点滴静注 2 0 mg :1mg/kg Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1	-
8 blo038	血液-内;古典的HL_ヒダラザ療法【2週毎】	ヒダラザ 240mg/body	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1	最小度
9 blo039	血液-内;NHL_リツキシマブ維持療法【8週毎】	リツキシマブ375mg/㎡,(8週毎),最大12クール	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 ソル・コナテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/㎡ Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/㎡ Day1	最小度

10	blo040	血液-内;PTCL_0377777(イボツツ)療法【4週毎】	0377777 day1,8,15 : 14mg/m ² 電解質 (K,Mg,Ca等) 、B肝ウイルス、CD4陽性Tリンパ球、ALP-値過敏等確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 グラニセロン点静注 バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day1 Day8 Day15 (緊) イソトキサス点静注 10mg/14mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-
11	blo044	血液-内;FL_【2-6】-目】GB療法【4週毎】	カザイ 1000mg/body (day1) ハンダ 90mg/m ² (day2,3) ※6ヶ月 ※70%以上は避ける	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) ガザイ点静注 1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセロン点静注 バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 Day3 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:3A Day2 Day3 トリアキシン点静注 100mg/4ml:90mg/m ² Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
12	blo045	血液-内;FL_【2-6】-目】維持療法【8週毎】	カザイ (day1) ※最大2年間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ガザイ点静注 1000mg (緊) :1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	-
13	blo054	血液-内;HL_A-AVD療法【2週毎】	未治療のCD30陽性HL【最大12コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 A点静注 0.75mg/50mL【発後】 (7日以後発) :1本 Day1 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:3A Day1 ビルビン注射用(規格なし):25mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 エケール注 10mg/V:6mg/m ² Day1 生食注 20mL/A:1A Day1 (口座) ガルバン注 100mg/V:375mg/m ² Day1 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (緊) アドセリス点静注用「カザ」 50mg/V:1.2mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	高度
14	blo055	血液-内;PTCL_A-THP-CP療法【3週毎】	未治療のCD30陽性PTCL【最大8コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点静注 バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day1 ビルビン注射用(規格なし):50mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):750mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (緊) アドセリス点静注用「カザ」 50mg/V:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	-
15	blo056	血液-内;NHL_VR-THP-CP療法【3週毎】	【最大8コース】	生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 ソル・コテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リクシマブ注(規格なし):375mg/m ² Day1 大塚蒸留水 (規格なし) :337.5ml/m ² Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day2 グラニセロン点静注 バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 ベルケイト注射用 3mg :1.3mg/m ² Day2 Day5 Day9 Day12 生食注 20mL/A:1A Day2 Day5 Day9 Day12 ビルビン注射用(規格なし):50mg/m ² Day2 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day2 エンドキサン注(規格なし):750mg/m ² Day2 生食注 250mL/袋:1袋 Day2	-
16	blo058	血液-内;MM_【1-12】-目】皮下療法【週1回】	4投1休【5週間】	ベルケイト注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
17	blo060	血液-内;MM_【12-12】-目】KRd療法【4週毎】	カザイ 27mg/m ² (Day1,2,8,9,15,16) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休薬 DEX(Day1,2,8,9,15,16,22),レプラミド(day1-21)	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:1A Day2 Day9 Day16 生食注 100mL (針なし) :1本 Day2 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (緊) カイロリス点静注用 (規格なし) :27mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
18	blo061	血液-内;MM_【13-12】-目以降】KRd療法【4週毎】	カザイ 27mg/m ² (Day1,2,15,16) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休薬 DEX(Day1,2,8,9,15,16,22),レプラミド(day1-21)	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day2 Day15 Day16 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:10A Day1 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day15 デキサトニ点静注 3.3mg/mL/A:1A Day2 Day16 生食注 100mL (針なし) :1本 Day2 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day15 Day16 (緊) カイロリス点静注用 (規格なし) :27mg/m ² Day1 Day2 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml :1本 Day1 Day2 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 Day2 Day15 Day16	-

19	blo063	血液-内;MM_ ₂ -1目以降]Kd療法[4週毎]	加シイリジ [®] 56mg/m ² (Day1, 2, 8, 9, 15, 16) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休薬	5%ブドウ糖注 2.5 0 mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキザード注射液 3. 3 mg/mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし):56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
20	blo065	血液-内;MM_ ₂ -1目以降]Kd療法(週1回)[4週毎]	加シイリジ [®] 70mg/m ² (Day1, 8, 15) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休薬	5%ブドウ糖注 2.5 0 mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 デキザード注射液 3. 3 mg/mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし):70mg/m ² Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	-
21	blo067	血液-内;MM_ ₂ -1目]ELd療法[4週毎]	エトツスマブ10mg/ k g (Day1,8,15,22),DEX(Day1,8,15,22),レボラミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキザード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 5 0 mL/袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
22	blo068	血液-内;MM_ ₃ -1目以降]ELd療法[4週毎]	エトツスマブ10mg/ k g (Day1,15),DEX(Day1,15),レボラミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 Day15 デキザード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 Day15 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day15 生食注 2 5 0 mL/袋:230ml Day1 Day15	-
23	blo069	血液-内;MM_ ₁ [1-2]-1目]EPd療法[4週毎]	エトツスマブ10mg/kg/day (day1,8,15,22),デキサメタゾン (day1,8,15,22),ボマリドミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキザード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 5 0 mL/袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
24	blo070	血液-内;MM_ ₃ -1目以降]EPd療法[4週毎]	エトツスマブ20mg/kg/day (day1),デキサメタゾン (day1,8,15,22),ボマリドミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 デキザード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし):20mg/kg Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 生食注 2 5 0 mL/袋:210ml Day1	-
25	blo072	血液-内;MM_ ₂ [2-3]-1目]DBd療法[3週毎]	ゲ [®] マシマ [®] 16mg/kg, day1,8,15, A [®] シマ [®] 1.3mg/m ² day1,4,8,11, 1 [®] マシマ [®] 80mg/week	ベルケイド注射用 3 mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 ガラレックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 0 mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-
26	blo073	血液-内;MM_ ₄ [4-8]-1目]DBd療法[3週毎]	ゲ [®] マシマ [®] 16mg/kg, day1, A [®] シマ [®] 1.3mg/m ² day1,4,8,11, 1 [®] マシマ [®] 80mg/week	ベルケイド注射用 3 mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 mL/A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 ガラレックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 5 0 0 mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-
27	blo074	血液-内;MM_ ₉ -1目以降]DBd療法[4週毎]	ゲ [®] マシマ [®] 16mg/kg, day1	生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 ガラレックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 5 0 0 mL/袋 (点滴用) :1本 Day1	-
28	blo075	血液-内;MM_ ₁ [1]-1目]DLd療法[4週毎]	ゲ [®] マシマ [®] 16mg/kg, day1,8,15,22,レボラミド [®] 25mg, day1~21, 1 [®] マシマ [®] 40mg/week	生食注 2 5 0 mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ガラレックス点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 5 0 0 mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-

29	blo076	血液-内;MM_[2]-1目]DLd療法【4週毎】	ダラレックス® 16mg/kg, day1, 8, 15, 22, カリトニト® 25mg, day1~21, アキテム® 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
30	blo077	血液-内;MM_[3-6]-1目]DLd療法【4週毎】	ダラレックス® 16mg/kg, day1, 15, カリトニト® 25mg, day1~21, アキテム® 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 ダラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day15	-
31	blo078	血液-内;MM_[7]-1目以降]DLd療法【4週毎】	ダラレックス® 16mg/kg, day1, カリトニト® 25mg, day1~21, アキテム® 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ダラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1	-
32	blo079	血液-内;神経痛_トリメチン(アケム)療法【2週毎】	トリメチン (8mg/kg)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (薬) アケム点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	-
33	blo081	内科.MM[2]10目以降]IsaPd療法【28日毎】	イサキサトニ® 10mg/kg day1, 15, アキテム® 40mg/day day1, 8, 15, 22, カリトニト® 4mg/m2 day1-21	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:12A Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 (薬) カリトニト点滴静注注(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15	-
34	blo083	血液-内;MM_[2]-1目]DKd療法【4週毎】	ダラレックス® 16mg/kg/day1, 8, 15, 22, カリトニト® 25mg/mi day1, 2, 8, 9, 15, 16, DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし):56mg/mi Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
35	blo084	血液-内;MM_[3-6]-1目]DKd療法【4週毎】	ダラレックス® 16mg/kg/day1, 15, カリトニト® 25mg/mi day1, 2, 8, 9, 15, 16, DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし):56mg/mi Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day15	-
36	blo085	血液-内;MM_[7]-1目以降]DKd療法【4週毎】	ダラレックス® 16mg/kg/day1, カリトニト® 25mg/mi day1, 2, 8, 9, 15, 16, DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし):56mg/mi Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1	-
37	blo086	血液-内;CLL_リツキサン®(375mg/mi)療法【4週毎】	リツキサン® 初回375mg/mi→2回目以降500mg/mi, 最大投与回数6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 リツキサン注射液100mg/V(溶解液付):1V Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 リツキサン注(規格なし):375mg/mi Day1 大塚生食注(規格なし):337.5ml/mi Day1	最小度

38	blo087	血液-内; CLL_リツキマツ (500mg/m)療法【4週毎】	リツキマツ 初回375mg/m ² →2回目以降500mg/m ² ,最大投与回数6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コステフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキマツ注(規格なし):500mg/m ² Day1 大塚生食注 (規格なし) :450ml/m ² Day1	最小値
39	blo089	血液-内; MM_【2-3-1-1目】scDBd療法【3週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,8,15,22,リツキマツ 1.3mg/m ² day1,4,8,11,リツキマツ注 80mg/week	ベルケイト注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A :1A Day1 Day4 Day8 Day11 (薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15	-
40	blo090	血液-内; MM_【4-8-1-1目】scDBd療法【3週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,8,15,22,リツキマツ 1.3mg/m ² day1,4,8,11,リツキマツ注 80mg/week	ベルケイト注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A :1A Day1 Day4 Day8 Day11 (薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1	-
41	blo091	血液-内; MM_【9-1-1目以降】scDBd療法【4週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,リツキマツ注 day1	(薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1	-
42	blo092	血液-内; NHL_polaRB療法【4週毎】	(DLBCL) day1RIT375mg/m ² ,day2A ¹ 51.8mg/kg,day2,3 A ¹ 注 90mg/m ² 【4週毎】※最大6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コステフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキマツ注(規格なし):375mg/m ² Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day2 Day3 (薬) ポライビーン点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day2 注射用水フゾン 20mL :1A Day2 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg/4ml:90mg/m ² Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
43	blo094	血液-内; MM_【2-1-1目】scDLd療法【4週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,8,15,22,リツキマツ注 25mg,day1-21,DEX40mg/week	(薬) ダラキユーロ配合皮下注15ml/V:1V Day1 Day8 Day15 Day22	-
44	blo095	血液-内; MM_【3-6-1-1目】scDLd療法【4週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,15,リツキマツ注 25mg,day1-21,DEX40mg/week	(薬) ダラキユーロ配合皮下注15ml/V:1V Day1 Day15	-
45	blo096	血液-内; MM_【7-1-1目以降】scDLd療法【4週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,リツキマツ注 25mg day1-21,DEX40mg/week※PDまで	(薬) ダラキユーロ配合皮下注15ml/V:1V Day1	-
46	blo099	血液-内; NHL_リツキマツ注(規格なし)療法【3週毎】	リツキマツ注(規格なし) 9μg/kg 最大8回まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (薬) レミト点静注用 300μg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水フゾン 20mL :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	-
47	blo101	血液-内-入; CP_【2-1-1目】scDCyBD療法【4週毎】	sc9 ⁹ ラツキマツ 1800mg/body day1,8,15,22 CPA(内服)300mg/midday1,8,15,22 リツキマツ 1.3mg/m ² day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	(薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイト注射用 3mg :1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A :1A Day1 Day8 Day15 Day22	-

48	blo102	血液-内;750_【3-6】-目】scDCyBD療法【4週毎】	sc9"ラゲム77" 1800mg/body day1,15, CPA(内服)300mg/m/day1,8,15,22 8"ルゲム77" 1.3mg/m/day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	(薬) グラキューロ配合皮下注:1V Day1 Day15 ヘルケイト注射用 3 mg :1.3mg/m Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 0 m L / A :1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
49	blo103	血液-内;750_【7】-目以降】scDCyBD療法【4週毎】	sc9"ラゲム77" 1800mg/body day1, DEX(内服)20mg day1	(薬) グラキューロ配合皮下注:1V Day1	-
50	blo105	血液-内;MM_【2】-目以降】IsaKd療法【4週毎】	イサキマ77" 10mg/kg day1,15, 8"ルゲム77" 56mg/m/day1,2,8,9,15,16, デキサーゾン 40mg/week	生食注250m L /袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 デキサーゾン注射液 3 . 3 m g /mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生食注100m L (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 (薬) ガーグリサ点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 Day15 生食注 5 0 m L (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイプロリス点滴静注用(規格なし) :56mg/m Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100m L / B :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
51	blo106	血液-内NHL_FCM療法【4週毎】	※最大43-3	生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラネトロン点滴静注用1 m g / 5 0 m L(HK):1本 Day1 Day2 Day3 (薬) フルダラ静注用 5 0 m g :25mg/m Day1 Day2 Day3 注射用水フソ-20m l :1A Day1 Day2 Day3 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 エンドキサン注(規格なし):200mg/m Day1 Day2 Day3 生食注 5 0 0 m L /袋 (点滴用) :1本 Day1 Day2 Day3 (口座) ノバントロン注 2 0 mg / 1 0 m L / V :8mg/m Day2 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day2	中等度
52	blo107	血液-内;AML_VEN + LDAC療法【4週毎】	【28日間】※PDまで	キロサイド注(規格なし):20mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10	最小度
53	blo108	血液-内;NHL_polaR-THP-CP療法【3週毎】	※polaR-THP-CP療法は63-3まで※7、83-3はRITのみ	生食注 5 0 0 m L /袋 (点滴用) :1本 Day1 Day3 ソル・コステフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day1 リツキシマブ注(規格なし):375mg/m Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/m Day1 グラネトロン点滴静注用1 m g / 5 0 m L(HK):1本 Day3 (薬) ポラビ点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day3 注射用水フソ-20m l :1A Day3 生食注 1 0 0 m L (針なし) :1本 Day3 ビルビン注射用(規格なし):50mg/m Day3 5%ブドウ糖注 1 0 0 m L / B :1本 Day3 エンドキサン注(規格なし):750mg/m Day3 生食注 2 5 0 m L /袋:1袋 Day3	高度