

## 【肺がん(外来)】

最終更新令和4年11月

|   | 当院<br>コード | レジメン名                                 | コメント               | 薬剤情報<br>薬品名：数量 投与日                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 催吐性<br>リスク  |
|---|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | lun001    | 肺-内;AMR(40mg/mi)療法【3週毎】               |                    | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day2 Day3<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3<br>(緊) カルセド注(規格なし):40mg/mi Day1 Day2 Day3<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day3                                                                                                                  | 中等度         |
| 2 | lun002    | 肺-内;DTX(60mg/mi)療法【3週毎】               | ドセタセル60mg/mi       | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1<br>ドセタセル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/mi Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                                                                                                                                                        | 軽度          |
| 3 | lun003    | 肺-内;CBDCA+PTX療法【3週毎】                  | CBDCA;AUC6         | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>フモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1<br>バクリタセル静注「ネビ」(規格なし):200mg/mi Day1<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                                            | 中等度<br>(特定) |
| 4 | lun004    | 肺-内;CBDCA+CPT-11療法【4週毎】               | CBDCA;AUC5         | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 Day15<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15<br>何/何/何塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):60mg/mi Day1 Day8 Day15<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                          | 中等度<br>(特定) |
| 5 | lun005    | 肺-内;CBDCA+VP-16療法【4週毎】                | CBDCA;AUC5         | ソルアセトD輸液 500mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day3<br>イトボシト点滴静注液100mg「サト」 100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                | 中等度<br>(特定) |
| 6 | lun006    | 肺-内;CBDCA+GEM療法【3週毎】                  | CBDCA;AUC5         | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/mi Day1 Day8<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                              | 中等度<br>(特定) |
| 7 | lun007    | 肺-内;CBDCA+PEM療法【3週毎】                  | CBDCA;AUC5         | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>アムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                                                                                      | 中等度<br>(特定) |
| 8 | lun008    | 肺-内;Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】             | CBDCA;AUC6         | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1<br>フモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1<br>バクリタセル注「ネビ」(規格なし):200mg/mi Day1<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1<br>ア/スチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 | 中等度<br>(特定) |
| 9 | lun009    | 肺-内;CBDCA(AUC2)+PTX(40mg/mi)+RT療法【毎週】 | CBDCA;AUC2 【放射線併用】 | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>フモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1<br>バクリタセル注「ネビ」(規格なし):40mg/mi Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>加味アフラ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                                                   | 中等度         |

|    |        |                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----|--------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10 | lun010 | 肺-内;CBDCA+S-1療法【3週毎】      | CBDCA;AUC5                          | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>加味アラブ点滴静注液〔日医工〕(規格なし):0mg/A Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1                                                                                                                                                              | 中等度<br>(特定) |
| 11 | lun011 | 肺-内;CBDCA+nabPTX療法【3週毎】   | CBDCA;AUC6                          | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15<br>グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15<br>(紫) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15<br>加味アラブ点滴静注液〔日医工〕(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 | 中等度<br>(特定) |
| 12 | lun012 | 肺-内;PEM療法【3週毎】            |                                     | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1<br>アリムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                           | 軽度          |
| 13 | lun013 | 肺-内;PEM+CBDCA+Bmab療法【3週毎】 | CBDCA;AUC6                          | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>アリムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>加味アラブ点滴静注液〔日医工〕(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1<br>アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1          | 中等度<br>(特定) |
| 14 | lun014 | 肺-内;PEM+Bmab療法【3週毎】       |                                     | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1<br>アリムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                               | 軽度          |
| 15 | lun015 | 肺-内;Bmab療法【3週毎】           |                                     | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>アバスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                  | 最小度         |
| 16 | lun016 | 肺-内;CDDP+CPT-11療法【3週毎】    | 小細胞肺癌…IP療法のday8,15のCPT-11単独投与【2投1休】 | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8<br>グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1 Day8<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8<br>仰/ナカ塩酸塩点滴静注液「トウ」(規格なし):60mg/mi Day1 Day8<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8                                                                                                                                  | 高度          |
| 17 | lun021 | 肺-内;ニルメチン療法【2週毎】          |                                     | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>オブジーホ注(規格なし):240mg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                        | 最小度         |
| 18 | lun022 | 肺-内;NGT療法【3週毎】            | 小細胞肺癌                               | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day3<br>(紫) ハイカムチン注射用1.1mg:1mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5                                                                                        | 軽度          |

|    |        |                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19 | lun023 | 肺-内;RAM+DTX療法【3週毎】                  |                                                                                              | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1<br>(緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>トセチル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/m Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1                                                                                                                                                 | 軽度          |
| 20 | lun024 | 肺-内;A°Δ7°0Δ7°療法【3週毎】                |                                                                                              | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>(緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最小度         |
| 21 | lun025 | 肺-内;A°Δ7°0Δ7°療法+CBDCa+PEM療法【3週毎】    | day1:A°Δ7°0Δ7°(200mg/body)、加林アヲヲ<br>(AUC5)、アリダ(500mg/m) ※4コース後、維持療法                          | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>(緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>アリムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>加林アヲヲ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                                                                          | 中等度<br>(特定) |
| 22 | lun026 | 肺-内;A°Δ7°0Δ7°療法+PEM療法【3週毎】          | 【維持療法】day1:A°Δ7°0Δ7°(200mg/body)、アリダ<br>(500mg/m) ※A°Δ7°0Δ7°は導入療法と合わせて計35回                   | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1<br>(緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>アリムタ注射用(規格なし):500mg/m Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                      | 軽度          |
| 23 | lun027 | 肺-内;A°Δ7°0Δ7°療法+CBDCa+PTX療法【3週毎】    | 【扁平】(day1)A°Δ7°0Δ7°:200mg/body,PTX:200mg/m, CBDCa:AUC6※最大4コース→維持療法へ(計35回)                    | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>ファモチジン静注 20mg「日新」(希釈液不要):1A Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1<br>(緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>バクリタキセル注(後発品)※→規格なし):200mg/m Day1<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1<br>加林アヲヲ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1                                              | 中等度<br>(特定) |
| 24 | lun028 | 肺-内;A°Δ7°0Δ7°療法+CBDCa+nabPTX療法【3週毎】 | 【扁平】A°Δ7°0Δ7°:200mg/body(day1),nab-PTX:100mg/m<br>(day1,8,15),CBDCa(AUC6)(day1)※最大4コース→維持療法へ | 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15<br>(緊)アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m Day1 Day8 Day15<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15<br>加林アヲヲ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1<br>(緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15                       | 中等度<br>(特定) |
| 25 | lun029 | 肺-内;アテゾリチン療法【3週毎】                   | 【進行再発NSCLC】[NSCLC adjuvant]【ED-SCLCの維持療法】                                                    | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>(緊)デセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 最小度         |
| 26 | lun030 | 肺-内;アテゾリチン療法+Bmab+CBDCa+PTX療法【3週毎】  | 【非扁平】(day1)アテゾリチン:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,PTX:175mg/m, CBDCa:AUC6※最大4コース→維持療法へ              | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1<br>ファモチジン静注 20mg「日新」(希釈液不要):1A Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1<br>(緊)デセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1<br>バクリタキセル注「糸」→(規格なし):175mg/m Day1<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1<br>加林アヲヲ点滴静注液「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 | 中等度<br>(特定) |
| 27 | lun031 | 肺-内;アテゾリチン療法+Bmab療法【3週毎】            | 【非扁平】(day1)アテゾリチン:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,※導入療法4コース後の維持療法                                   | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>(緊)デセントリク点滴静注 1200mg:1200mg Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>アスチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                     | 最小度         |

|    |        |                                |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|----|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 28 | lun032 | 肺-内;アサリヌマ7°+CBDCA+VP-16療法【3週毎】 | 【ED-SCLC】(day1)アサリヌマ7°:1200mg/body,CBDCA:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/m <sup>2</sup> ※41-ス→維持療法へ | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3<br>グラニセロン点滴静注(バグ)1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3<br>(紫) デセントリク点滴静注 1200mg Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>イトボシド点滴静注100mg「サト」 100mg/5mL/V:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3<br>加味アサリヌマ点滴静注「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1<br>生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3 | 中等度<br>(特定) |
| 29 | lun033 | 肺-内;アサリヌマ7°療法【2週毎】             | 【地固め療法】デュルバルマブ(day1) 10mg/kg ※投与期間は、初回投与から12ヶ月間まで                                            | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>イミフンジ注(規格なし):10mg/kg Day1<br>生食注 250mL/袋:1袋 Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 最小度         |
| 30 | lun034 | 肺-内;アサリヌマ7°+CBDCA+VP-16療法【3週毎】 | 【ED-SCLC】(day1)アサリヌマ7°:1500mg/body,CBDCA:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/m <sup>2</sup> ※41-ス→維持療法へ | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3<br>グラニセロン点滴静注(バグ)1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3<br>イトボシド点滴静注100mg「サト」 100mg/5mL/V:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3<br>生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3<br>加味アサリヌマ点滴静注「日医工」(規格なし):0mg/A Day1<br>5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1<br>イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1<br>生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3                          | 中等度<br>(特定) |
| 31 | lun035 | 肺-内;アサリヌマ7°1500療法【4週毎】         | 【維持療法】アサリヌマ7°+CBDCA+VP-16【3週毎】41-ス後に実施。※PDまで                                                 | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 最小度         |
| 32 | lun036 | 肺-呼外;アサリヌマ7°400療法【6週毎】         | アサリヌマ7° 400mg/body                                                                           | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>(紫) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:400mg Day1<br>生食注 100mL(針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 最小度         |
| 33 | lun037 | 肺-内;RAM+EGFR-TKI療法【2週毎】        | RAM 10mg/kg,EGFR-TKI(各々の添付文書どおり)※PDまで                                                        | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>(紫)サイラムザ点滴静注(規格なし):10mg/kg Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 最小度         |
| 34 | lun040 | 肺-内;ニホリヌマ7°+化°リムマ7°療法【6週毎】     | 【NSLC】【悪性中皮腫】day1,22ニホリヌマ7°360mg/body,day1化°リムマ7°1mg/kg※PDまで、ニホリヌマ7°、化°リムマ7°は最長2年間まで投与可      | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day22<br>(紫) ヤーボイ点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1<br>生食注 50mL(針なし):30ml Day1<br>生食注 50mL(針なし):1本 Day1<br>オブジーボ注(規格なし):360mg Day1 Day22<br>生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day22                                                                                                                                                                                      | 最小度         |
| 35 | lun041 | 肺-内;ニホリヌマ7°480療法【4週毎】          | (day1)ニホリヌマ7°480mg※PDまで                                                                      | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1<br>オブジーボ注(規格なし):480mg Day1<br>生食注 100mL(針なし):1本 Day1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最小度         |

|    |        |                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|----|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 36 | lun043 | 肺-内;(short) シタム77 + CDDP + GEM療法【3週毎】 | 【扁平】※最大4コース→維持療法(シタム77単独)へ ★年齢、PS、腎機能、心機能、1L/日以上での飲水可能を確認。 | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8<br>(緊) ポートラザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8<br>生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8<br>パロチド点滴静注液 0.75mg/50mL(7分前) (70分後発):1本 Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day8<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day8<br>ゲムシタピン点滴静注用「NKJ」(規格なし):1250mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8<br>ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1<br>硫酸Mg補正液 1mEq/mL:9ml Day1<br>シスプラチン注「日医工」(規格なし) (後発品):75mg/m <sup>2</sup> Day1<br>生食注 500mL/袋 (点滴用):1本 Day1<br>フロセミド注「トーワ」20mg/2mL/A:1A Day1<br>20%マンニトール注射液「YD」300mL:1袋 Day1<br>KN3号輸液 500mL:1袋 Day1 | 高度  |
| 37 | lun044 | 肺-内;シタム77 維持療法【3週毎】                   | ※シタム77 + CDDP + GEM療法4コース後の維持療法、PDまで                       | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8<br>(緊) ポートラザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8<br>生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 最小度 |
| 38 | lun046 | 肺-内;nabPTX療法【3週毎】                     | ※PDまで                                                      | 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15<br>デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15<br>生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15<br>(緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15<br>生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 軽度  |