

【頭頸部がん(外来)】

最終更新令和4年11月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 hea008	頭頸部-耳;[2回-1目]-PTX+Cmab療法【毎週】	Cmab 400mg/m <sup>2</sup> (初回)、250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)、PTX 80mg/m <sup>2</sup>	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:3A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) アーピタックス注射液100mg/20mL/V:250mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 フアモジジン静注20mg「日新」[希釈液不要]:1A Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 バクリタキセル静注「レルー」(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
2 hea009	頭頸部-耳;[1回-1目]Cmab療法【毎週】	初回(400mg/m <sup>2</sup> )、放射線併用	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) アーピタックス注射液100mg/20mL/V:400mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
3 hea010	頭頸部-耳;[2回-1目]Cmab療法【毎週】	2回目以降(250mg/m <sup>2</sup> )、放射線併用	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) アーピタックス注射液100mg/20mL/V:250mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
4 hea012	頭頸部-歯;ニボルマブ療法【2週毎】	ニボルマブ 240mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
5 hea016	頭頸部-歯;ケイトルーダ点滴療法【3週毎】	ケイトルーダ点滴療法 200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) ケイトルーダ点滴療法 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
6 hea017	頭頸部-歯;CBDCA+RT療法【毎週】	CBDCA 75mg/m <sup>2</sup> ※放射線治療を開始してから終了まで、週1回投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴療法バグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液3.3mg/mL/A:3A Day1 加藤アザノ点滴療法「日医工」(規格なし):75mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる