

【胃がん(外来)】

最終更新令和4年11月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 gas001	胃-内;RAM+PTX療法【4週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :80mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	軽度
2 gas003	胃-内;CPT-11療法【2週毎】	CPT-11 150mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 ｲﾝﾌﾙｶﾞ塩酸塩点滴静注液「ﾄｰｸ」(規格なし):150mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度 (特定)
3 gas004	胃-内;SOX療法【3週毎】	3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度
4 gas005	胃-内;RAM+nabPTX療法【4週毎】	サイラムザ 8mg/kg, day1, 15, nab-PTX 100mg/m2, day1, 8, 15, 注) day15 スキップ時でも休業期間は短縮しないこと	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 (緊) アプキササン点滴静注用 100mg (特生物) :100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	軽度
5 gas006	胃-外;DTX療法【3週毎】	3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 トモチル点滴静注液「ニプロ」 (規格なし) :70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
6 gas008	胃-外;S-1+DTX療法【3週毎】	3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 トモチル点滴静注液「ニプロ」 (規格なし) :40mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	軽度
7 gas009	胃-外;PTX(80mg/mi)療法【weekly】	weekly PTX 80mg/m2	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサト注射液3. 3mg/mL/A:3A Day1 ファモチジン静注20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 バクリタキセル静注「ネビ」(規格なし) :80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
8 gas014	胃-外;ニボルマブ療法【2週毎】	ニボルマブ 240mg/body ※3次治療以降に導入を検討	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
9 gas015	胃-外;【7ヶ-目-】Tmab(8)+Cape(CDDP無)療法【3週毎】	HER + XP療法7ヶ-以降, HER8mg/kg, + cape2000mg/m2【3週毎】 ★※HER 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「NKI」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度

10	gas016	胃-外;【7ヶ-目-】Tmab(6)+Cape(CDDP無)療法【3週毎】	HER + XP療法7ヶ-目以降,HER6mg/kg, + cape2000mg/m2【3週毎】 ★☆HER : 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1	最小度
11	gas017	胃-外;トラスズマブ® テルチリチカ(エンハ-)療法【3週毎】	トラスズマブ® テルチリチカ6.4mg/kg	5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 (緊)エンハーツ点滴静注用100mg:6.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
12	gas018	胃-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	11-14日間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 iホト点滴静注用 (規格なし) :200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオロウラシル注 (規格なし) :2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)
13	gas019	胃-外;ニホルマブ® +SOX療法【3週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊) オプジーボ点滴静注 240mg/24mL/V:1V Day1 (緊) オプジーボ点滴静注 120mg/12mL/V:1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度
14	gas020	胃-内;RAM単独I療法【2週毎】	RAM 8mg/kg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1	最小度
15	gas021	胃-外;【初回】Tmab(8) + SOX療法【3週毎】	3週毎 ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度
16	gas022	胃-外;【2ヶ-目-】Tmab(6) + SOX療法【3週毎】	3週毎 ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :100mg/mi Day1 5%ブドウ糖注500mL (ソフト) :1本 Day1	中等度