

【神経内分泌腫瘍(外来)】

最終更新令和5年11月

	当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1	neu001	内;NET_スルガトリン5日間連日療法【6週毎】	スルガトリン500mg/m <sup>2</sup> day1-5 ※PDまで	生食注 500mL/袋(点滴用):2本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 パロチド点滴静注パロチド0.75mg/50mL「パロチド」(7日以後発):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (緊) ザノサ点滴静注用1g/1000mg/V:500mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day3 Day4 Day5	高度
2	neu002	内;NET_スルガトリン1回(1000mg/m <sup>2</sup> )療法【毎週】	スルガトリン1000mg/m <sup>2</sup> day1 ※PDまで	生食注 500mL/袋(点滴用):2本 Day1 パロチド点滴静注パロチド0.75mg/50mL「パロチド」(7日以後発):1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 (緊) ザノサ点滴静注用1g/1000mg/V:1000mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	高度