

【乳がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 bre002	乳-外;【固定量】PTX療法【毎週】	PTX;100mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フアモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注【ネビール】(規格なし):100mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる
2 bre003	乳-外;DTX(70mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 トラスツズマブ点滴静注【ニプロ】(規格なし):70mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 bre004	乳-外;PTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フアモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注【ネビール】(規格なし):175mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL(ソフト):1本 Day1	中等度に 準ずる
4 bre005	乳-外;FEC療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 パクリタキセル点滴静注バッグ 0.75mg/50mL【ネビール】(70粒後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 エビルピリン塩酸塩注射液(規格なし):100mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 フルオロウラシル注(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	高度
5 bre006	乳-外;VNR(20mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):20mg/mi Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8	最小度
6 bre007	乳-外;【初回】PTX+Tmab(4mg/kg)療法【毎週】	PTX(day1);80mg/mi,HER(day1);4mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フアモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注【ネビール】(規格なし):80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【NK】(規格なし):4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
7 bre008	乳-外;【2回以降】PTX+Tmab(2mg/kg)療法【毎週】	PTX(day1):80mg/mi,HER(day1):2mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 フアモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 パクリタキセル静注【ネビール】(規格なし):80mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 トラスツズマブBS点滴静注用【NK】(規格なし):2mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度に 準ずる
8 bre009	乳-外;PTX療法(3投1休)療法【4週毎】	day1,8,15	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 フアモチジン静注 2.0mg[日新]【希釈液不要】:1A Day1 Day8 Day15 パクリタキセル静注【ネビール】(規格なし):80mg/mi Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に 準ずる
9 bre010	乳-外;nabPTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 (製) アブラキサン点滴静注用 100mg(特生物):260mg/mi Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	中等度に 準ずる

10	bre011	乳-外;【初】-λ PTX(175)+Tmab(8)療法【3週毎】	PTX175mg/m+HER8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1            フアモジン静注 2.0mg〔日新〕〔希釈液不要〕:1A Day1            パクリタキセル静注〔ネビテ〕 (規格なし):175mg/m Day1            5%ブドウ糖注 500mL (シフト):1本 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用〔NK〕 (規格なし):8mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に準ずる
11	bre012	乳-外;【2】-λ以降 PTX(175)+Tmab(6)療法【3週毎】	PTX175mg/m+HER6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1            フアモジン静注 2.0mg〔日新〕〔希釈液不要〕:1A Day1            パクリタキセル静注〔ネビテ〕 (規格なし):175mg/m Day1            5%ブドウ糖注 500mL (シフト):1本 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用〔NK〕 (規格なし):6mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度に準ずる
12	bre013	乳-外;AC療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            グラセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL〔70〕 (70時後発):1本 Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1            テキサソルピジン塩酸塩注(規格なし):60mg/m Day1            生食注 100mL (針なし):1本 Day1            エンドキサン注(規格なし):600mg/m Day1            生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	高度
13	bre014	乳-外;Bmab(10mg/kg)+PTX(90mg/m)療法【4週毎】	Bmab10mg/kg (day1,15) +PTX90mg/m (day1,8,15)	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15            アリステチン点滴静注用 (規格なし):10mg/kg Day1 Day15            生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day15            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15            フアモジン静注 2.0mg〔日新〕〔希釈液不要〕:1A Day1 Day8 Day15            生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15            パクリタキセル静注〔ネビテ〕 (規格なし):90mg/m Day1 Day8 Day15            5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15</p>	軽度
14	bre015	乳-外;IA療法 (1投1休)【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1            生食注 50mL (針なし):1本 Day1            (薬) ハラヴェン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m Day1            生食注 50mL (針なし):25ml Day1</p>	軽度
15	bre016	乳-外;IA療法 (2投1休)【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8            生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8            (薬) ハラヴェン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m Day1 Day8            生食注 50mL (針なし):25ml Day1 Day8</p>	軽度
16	bre017	乳-外;【初】-λ Tmab療法【3週毎】	HER 8mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用〔NK〕 (規格なし):8mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
17	bre018	乳-外;【2】-λ以降 Tmab療法【3週毎】	HER 6mg/kg	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用〔NK〕 (規格なし):6mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	最小度
18	bre019	乳-外;【初】-λ 〆 〆 〆 +Tmab+DTX療法【3週毎】	〆 〆 〆 17840mg/body、〆 〆 〆 8mg/kg、ト 〆 〆 〆 60mg/m2 ※〆 〆 〆 17前回投与より6週以上の間隔を確認	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1            デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1            生食注 50mL (針なし):1本 Day1            (薬) パーシタ点滴静注 4.2mg/1.4mL:840mg Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1            トラスツズマブBS点滴静注用〔NK〕 (規格なし):8mg/kg Day1            大塚蒸留水100mL:1本 Day1            生食注 250mL/袋:1袋 Day1            ト 〆 〆 〆 点滴静注用〔ニプロ〕 (規格なし):60mg/m Day1            5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1</p>	軽度

19	bre020	乳-外;【2】-以降)A° 11°ママ° +Tmab+DTX療法【3週毎】	ル°→° 1°420mg/body、ル°セ° 1°6mg/kg、ト°セ° 60mg/m2	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) パーシタ点滴静注 420mg / 14mL:420mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ト°セ°点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
20	bre021	乳-外;TDM1療法【3週毎】	カドサイラ3.6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊) カドサイラ点滴静注用 (規格なし):3.6mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
21	bre022	乳-外;【初】-以降)DTX+Tmab療法【3週毎】	ト°セ° 75mg/m、ル°セ° 8mg/kg、3週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ト°セ°点滴静注液「ニプロ」(規格なし):75mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
22	bre023	乳-外;【2】-以降)DTX+Tmab療法【3週毎】	ト°セ° 75mg/m2、ル°セ° 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ト°セ°点滴静注液「ニプロ」(規格なし):75mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
23	bre024	乳-外;TC(DTX+CPA)療法【3週毎】	★FN高リスク	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グニセトロン点滴静注「バッグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ト°セ°点滴静注液「ニプロ」(規格なし):75mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度
24	bre025	乳-外;【初】-以降)nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週)療法	【4週毎】nabPTX: day1,8,15 HER: day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):4mg/kg Day1 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):2mg/kg Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
25	bre026	乳-外;【2】-以降)nabPTX(3投1休)+Tmab(毎週)療法	【4週毎】nabPTX: day1,8,15 HER: day1,8,15,22 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 トラスズマブBS点滴静注用「NK」(規格なし):2mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
26	bre027	乳-外;nabPTX(3投1休)療法【4週毎】	nab-PTX 100mg/m day1,8,15 ※患者状態、最新の情報を確認し、使用を検討すること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/m Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度

27	bre028	乳-外;【初回-1】EPリ+Tmab療法【3週毎】	EPリ(day1,8) : 1.4mg/m <sup>2</sup> , HER (day1) : 8mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 (緊) ハラヴェン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用「NKJ」(規格なし):8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
28	bre029	乳-外;【2回-以降】EPリ+Tmab療法【3週毎】	EPリ(day1,8) : 1.4mg/m <sup>2</sup> , HER (day1) : 6mg/kg	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 (緊) ハラヴェン静注 1mg/2mL/V:1.4mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :25ml Day1 Day8 トラスツズマブBS点滴静注用「NKJ」(規格なし):6mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
29	bre030	乳-外;アブリクスマブ+nabPTX療法【4週毎】	アブリクスマブ:840mg/body (day1,15), nab-PTX:100mg/m <sup>2</sup> (day1,8,15)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊) アブリクス点滴静注用 100mg (特生物) :100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (緊) デセントロ点滴静注840mg:840mg Day1 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
30	bre031	乳-外;A <sup>△</sup> EPリ+GEM+CBDC療法【3週毎】	※PDまで(A <sup>△</sup> EPリは計35回まで)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 (緊) キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用「NKJ」(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 加藤アブリ点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=2 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL (ソフト) :1本 Day8	中等度に準ずる
31	bre032	乳-外;トラスツズマブ デセントロ(エンハ)療法【3週毎】	トラスツズマブ デセントロ5.4mg/kg	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 バノセトロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:2A Day1 (緊)エンハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1	中等度(特定)
32	bre033	乳-外;A <sup>△</sup> EPリ+PTX療法【12週ごと】	A <sup>△</sup> EPリ day1,22,43,64 PTXday1,8,15,29,36,43,57,64,71 ※PDまで(A <sup>△</sup> EPリは計35回まで)	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 Day22 Day43 Day64 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day22 Day43 Day64 バクシケル静注「北」(規格なし) :90mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 アブリクス点滴静注 20mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day57 Day64 Day71	中等度に準ずる
33	bre034	乳-外-入;CBDC+PTX療法【4週毎】	[adjuvant]※6回まで、CBDC(AUC=2)	生食注 50mL/袋(点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 アブリクス点滴静注 20mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 バクシケル静注「北」(規格なし) :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加藤アブリ点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=2 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
34	bre035	乳-外;【術前①】A <sup>△</sup> EPリ+CBDC+PTX療法	[neoadjuvant]【3週毎】※4回→ →【術前②】A <sup>△</sup> EPリ+AC/EC療法へ	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :3本 Day1 グラニセロン点滴静注「バグ」1mg/50mL「HK」:1本 Day1 Day8 Day15 アブリクス点滴静注 20mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 Day8 Day15 バクシケル静注「北」(規格なし) :80mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:2袋 Day1 Day8 Day15 加藤アブリ点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=2 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day8 Day15	中等度に準ずる
35	bre036	乳-外;【術前②】A <sup>△</sup> EPリ+AC療法【3週毎】	[neoadjuvant]※4回→【術後③】A <sup>△</sup> EPリ療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 バノセトロン点滴静注「バグ」0.75mg/50mL「北」(70%後発) :1本 Day1 デキサート注射液 3. 3mg/mL/A:3A Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 ドキシソリン塩酸塩注(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 エンドキサン注(規格なし):600mg/m <sup>2</sup> Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1	高度

36 bre037	乳-外;【術後③】A°Δ°D°M°S°V°療法【3週毎】	[adjuvant(計9回)] ※術前補助療法 (A°Δ°D°M°S°V°+化学療法後) に実施	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	最小度
-----------	------------------------------	---	--	-----