

【血液腫瘍(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 blo001	血液-内;MDS/AML_アザチオチン(ヒダラ-ザ)皮下療法	5-2-2[28日間]※PDまで 制吐剤としてアザチオチン投与前にヒダラ70.1mg錠を服用 【MDS】 他の抗悪性腫瘍剤との併用は、有効性及び安全性は確立していない。 【AML:ベネトクラクスとの併用療法の場合】 *ベネトクラクス(ベネグレクスタ)1日1回食後の連日投与	(緊) ビダラザ注射用 1 0 0 mg :75mg/㎡ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水フゾム20m l :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9	中等度
2 blo002	血液-内;APL_ATO療法(寛解導入後)【25回】	三酸化二砒素0.15mg/kg.5週間の間に1日1回計25回	生食注250mL/袋(点滴用) : 1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 トシレックス注 1 2 mg 12mg/6mL/V:0.15mg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 250mL/袋 : 1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	中等度であるが、 制吐剤なしで対応
3 blo024	血液-内;NHL_R-THP-COP療法【3週毎】	※最大83-1まで アトリンをday3-7に服用	生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1 ソル・コナフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 リクシマブ注(規格なし):375mg/㎡ Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/㎡ Day1 生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day3 オンゴピン注 1 mg/V:1.4mg/㎡ Day3 生食注 2 0 mL / A :1A Day3 ピルビン注射用(規格なし):50mg/㎡ Day3 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL / B :1本 Day3 エンドキサン注(規格なし):750mg/㎡ Day3 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day3	高度
4 blo025	血液-内;NHL_THP-COP療法【3週毎】	※最大83-1まで アトリンをday1-5に服用	生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day1 オンゴピン注 1 mg/V:1.4mg/㎡ Day1 生食注 2 0 mL / A :1A Day1 ピルビン注射用(規格なし):50mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL / B :1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):750mg/㎡ Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1	高度
5 blo026	血液-内;NHL_RB療法【4週毎】	day1リクシマブ 375mg/㎡ day2,3アザチオチン 90mg/㎡	生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1 ソル・コナフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 リクシマブ注(規格なし):375mg/㎡ Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/㎡ Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3 . 3 mg / mL/A:3A Day2 Day3 トリアキシン点滴静注液100mg/4mL:90mg/㎡ Day2 Day3 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day2 Day3	中等度
6 blo028	血液-内;HL_ABVD療法【2週毎】	THP25mg/m2+BLM10mg/m2+VBL6mg/m2+DTIC375mg/m2	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg / mL/A:3A Day1 ピルビン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(94%) (7日以後発) :1本 Day1 ピルビン注射用(規格なし):25mg/㎡ Day1 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL / B :1本 Day1 (緊) プレオ注射用15 mg :10mg/㎡ Day1 生食注 2 0 mL / A :1A Day1 エクザール注 1 0 mg/V:6mg/㎡ Day1 生食注 2 0 mL / A :1A Day1 (口座) ガルバシ注用 1 0 0 mg/V:375mg/㎡ Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 mL/B:1本 Day1	高度
7 blo032	血液-内;ATLL_ヒダラザ(ヒダラザ)療法【毎週】	ヒダラザ 1mg/kg	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 ソル・コナフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 (緊) ポテリゾ点滴静注 2 0 mg :1mg/kg Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1	-
8 blo037	血液-内-入;NHL_GCD療法【3週毎】	ゲムシタピン1000mg/m2、加藤アザチオチンAUC:5	生食注 25 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用「NK」(規格なし):1000mg/㎡ Day1 Day8 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 加藤アザチオ点滴静注液「日医工」(規格なし) :AUC=5 Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1 mg / 5 0 mL(HKJ):1本 Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg / mL/A:10A Day1 デキサート注射液 3 . 3 mg / mL/A:2A Day8	中等度
9 blo038	血液-内;古典的HL_ヒダラザ療法【2週毎】	ヒダラザ 240mg/body	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 オプジーボ注(規格なし):240mg Day1 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1	最小度

10	blo039	血液-内; NHL_リツキマブ維持療法【8週毎】	リツキマブ375mg/m <sup>2</sup> , (8週毎), 最大12クール	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コステブ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキマブ注(規格なし):375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/m <sup>2</sup> Day1	最小度
11	blo040	血液-内; PTCL_05777777(イリシニブ)療法【4週毎】	05777777 day1, 8, 15 : 14mg/m <sup>2</sup> 電解質 (K, Mg, Ca等) 、B型肝炎ウイルス、CD4陽性Tリンパ球、7歳以上過敏等確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day1 Day8 Day15 (薬) イストラックス点滴静注用 10mg:14mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-
12	blo044	血液-内; FL_【2-6】-項目GB療法【4週毎】	カザイバ 1000mg/body (day1) ヘンタム 90mg/m <sup>2</sup> (day2,3) ※6ヶ月 ※70%リリ-は避ける	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (薬) ガザイバ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day2 Day3 トリアキシン点滴静注液 100mg/4ml:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
13	blo045	血液-内; FL_【2-6】-項目(カザイバ)維持療法【8週毎】	カザイバ (day1) ※最大2年間	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ガザイバ点滴静注 1000mg (薬) :1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	-
14	blo054	血液-内; HL_A-AVD療法【2週毎】	未治療のCD30陽性HL【最大12コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 0.75mg/50mL【7】(7時後発) :1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ビルビン注射用(規格なし):25mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 エカザール注 10mg/V:6mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 20mL/A:1A Day1 (口座) ガルバシ注用 100mg/V:375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (薬) アドセトス点滴静注用「カガ」 50mg/V:1.2mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	高度
15	blo055	血液-内; PTCL_A-THP-CP療法【3週毎】	未治療のCD30陽性PTCL【最大8コース】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day1 ビルビン注射用(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day1 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 エンドキサン注(規格なし):750mg/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 (薬) アドセトス点滴静注用「カガ」 50mg/V:1.8mg/kg Day1 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	-
16	blo056	血液-内; NHL_VR-THP-CP療法【3週毎】	【最大8コース】 フレドニン錠5mg 1日2回 100mg/日 day2-6 5日分	生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 ソル・コステブ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキマブ注(規格なし):375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/m <sup>2</sup> Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day2 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL/HKJ:1本 Day2 ベルケイト注射液 3mg:-1.3mg/m <sup>2</sup> Day2 Day5 Day9 Day12 生食注 20mL/A:1A Day2 Day5 Day9 Day12 ビルビン注射用(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day2 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day2 エンドキサン注(規格なし):750mg/m <sup>2</sup> Day2 生食注 250mL/袋:1袋 Day2	-
17	blo058	血液-内; MM_【2-12】-項目(カザイバ)皮下療法【週1回】	4投1休【5週間】DEX(Day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22)	ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	軽度
18	blo060	血液-内; MM_【2-12】-項目KRd療法【4週毎】	カザイバ 27mg/m <sup>2</sup> (Day1, 2, 8, 9, 15, 16)※最大2.2まで※Ccrが15mL/分未満で休業 DEX(Day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22), レプラミド(day1-21)	5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:1A Day2 Day9 Day16 生食注 100mL (針なし) :1本 Day2 Day9 Day16 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイプロリス点滴静注用 (規格なし) :27mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-

19	blo061	血液-内;MM_ <sub>[13]</sub> - <sub>7</sub> 目以降]KRd療法[4週毎]	加ナドリン <sup>®</sup> 27mg/m <sup>2</sup> (Day1,2,15,16) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休業 DEX(Day1,2,8,,15,16,22),レプラミド(day1-21)	5%ブドウ糖注 2.5 0 mL/B:1本 Day1 Day2 Day15 Day16 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:10A Day1 Day15 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day15 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:1A Day2 Day16 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day2 Day16 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day15 Day16 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし) :27mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day15 Day16 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day2 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL/B :1本 Day1 Day2 Day15 Day16	-
20	blo063	血液-内;MM_ <sub>[2]</sub> - <sub>7</sub> 目以降]Kd療法[4週毎]	加ナドリン <sup>®</sup> 56mg/m <sup>2</sup> (Day1, 2, 8, 9, 15, 16) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休業,DEX(Day22,23)	5%ブドウ糖注 2.5 0 mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし) :56mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL/B :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
21	blo065	血液-内;MM_ <sub>[2]</sub> - <sub>7</sub> 目以降]Kd療法(週1回)[4週毎]	加ナドリン <sup>®</sup> 70mg/m <sup>2</sup> (Day1, 8, 15) ※最大2.2mlまで ※Ccrが15mL/分未満で休業,DEX(Day22)	5%ブドウ糖注 2.5 0 mL/B:1本 Day1 Day8 Day15 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:10A Day1 Day8 Day15 生食注 1 0 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 (薬) カイロリス点滴静注用(規格なし) :70mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 1 0 0 mL/B :1本 Day1 Day8 Day15	-
22	blo067	血液-内;MM_ <sub>[2]</sub> - <sub>7</sub> 目]ELd療法[4週毎]	エトツスマブ10mg/ k g (Day1,8,15,22),DEX(Day1,8,15,22),レプラミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし) :10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 5 0 mL / 袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
23	blo068	血液-内;MM_ <sub>[3]</sub> - <sub>7</sub> 目以降]ELd療法[4週毎]	エトツスマブ10mg/ k g (Day1,15),DEX(Day1,15),レプラミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 Day15 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 Day15 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし) :10mg/kg Day1 Day15 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day15 生食注 2 5 0 mL / 袋:230ml Day1 Day15	-
24	blo069	血液-内;MM_ <sub>[1-2]</sub> - <sub>7</sub> 目]EPd療法 [4週毎]	エトツスマブ10mg/kg/day (day1,8,15,22) ,デキサメタゾン (day1,8,15,22) ,ボマリドミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 Day22 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし) :10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 2 5 0 mL / 袋:230ml Day1 Day8 Day15 Day22	-
25	blo070	血液-内;MM_ <sub>[3]</sub> - <sub>7</sub> 目以降]EPd療法[4週毎]	エトツスマブ20mg/kg/day (day1) ,デキサメタゾン (day1,8,15,22) ,ボマリドミド(day1-21)	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 デキサード注射液 3. 3 mg/mL/A:2A Day1 (薬) エムアジステ点滴静注用(規格なし) :20mg/kg Day1 大塚蒸留水100m l :1本 Day1 生食注 2 5 0 mL / 袋:210ml Day1	-
26	blo072	血液-内;MM_ <sub>[2-3]</sub> - <sub>7</sub> 目]DBd療法[3週毎]	ダラゲク <sup>®</sup> 16mg/kg, day1,8,15, A <sup>®</sup> ドリン <sup>®</sup> 1.3mg/m <sup>2</sup> day1,4,8,11, <sup>®</sup> サマリン <sup>®</sup> 80mg/week	ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 mL / A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 Day8 Day15 ダラゲク <sup>®</sup> 点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1 Day8 Day15	-
27	blo073	血液-内;MM_ <sub>[4-8]</sub> - <sub>7</sub> 目]DBd療法[3週毎]	ダラゲク <sup>®</sup> 16mg/kg, day1, A <sup>®</sup> ドリン <sup>®</sup> 1.3mg/m <sup>2</sup> day1,4,8,11, <sup>®</sup> サマリン <sup>®</sup> 80mg/week	ボルテゾミブ注射用 3 mg :1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 0 mL / A:1A Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 Day8 Day15 ダラゲク <sup>®</sup> 点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1	-
28	blo074	血液-内;MM_ <sub>[9]</sub> - <sub>7</sub> 目以降]DBd療法[4週毎]	ダラゲク <sup>®</sup> 16mg/kg, day1	生食注 2 5 0 mL / 袋:1袋 Day1 ダラゲク <sup>®</sup> 点滴静注用(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 5 0 0 mL / 袋 (点滴用) :1本 Day1	-

29	blo075	血液-内;MM_[1]-1目]DLd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg, day1, 8, 15, 22, トレチニチド 25mg, day1~21, 7-チタニウム 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
30	blo076	血液-内;MM_[2]-1目]DLd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg, day1, 8, 15, 22, トレチニチド 25mg, day1~21, 7-チタニウム 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
31	blo077	血液-内;MM_[3]-6目]DLd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg, day1, 15, トレチニチド 25mg, day1~21, 7-チタニウム 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day15	-
32	blo078	血液-内;MM_[7]-1目以降]DLd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg, day1, トレチニチド 25mg, day1~21, 7-チタニウム 40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1	-
33	blo079	血液-内;特異的抗体療法【2週毎】	トリスタマ (8mg/kg)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (薬) アクテムラ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	-
34	blo081	内科.MM[2]以降目以降]IsaPd療法【28日毎】	イサゾキサジン 10mg/kg day1, 15, 7-チタニウム 40mg/day day1, 8, 15, 22, アクリン酸 4mg day1-21	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:12A Day1 Day15 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day15 (薬) サークリザ点滴静注注(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15	-
35	blo083	血液-内;MM_[2]-1目]DKd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg/day1, 8, 15, 22, 加糖イソキサジン 56mg/ml day1, 2, 8, 9, 15, 16, DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイプロリス点滴静注用(規格なし):56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day8 Day15 Day22	-
36	blo084	血液-内;MM_[3]-6目]DKd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg/day1, 15, 加糖イソキサジン 56mg/ml day1, 2, 8, 9, 15, 16, DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day8 Day9 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイプロリス点滴静注用(規格なし):56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 Day15 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day15	-
37	blo085	血液-内;MM_[7]-1目以降]DKd療法【4週毎】	ゲラレックス 16mg/kg/day1, 15, 加糖イソキサジン 56mg/ml day1, 2, 8, 9, 15, 16, DEX40mg/week	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイプロリス点滴静注用(規格なし):56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100ml:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ゲラレックス点滴静注注(規格なし):16mg/kg Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1	-

38	blo086	血液-内;CLL_リツキサマ <sup>®</sup> (375mg/m)療法【4週毎】	リツキサマ <sup>®</sup> 初回375mg/m <sup>2</sup> →2回目以降500mg/m <sup>2</sup> ,最大投与回数6回、A <sup>*</sup> 補ケラス 400mg連日投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキサマ注(規格なし):375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(規格なし) :337.5ml/m <sup>2</sup> Day1	最小度
39	blo087	血液-内;CLL_リツキサマ <sup>®</sup> (500mg/m)療法【4週毎】	リツキサマ <sup>®</sup> 初回375mg/m <sup>2</sup> →2回目以降500mg/m <sup>2</sup> ,最大投与回数6回、A <sup>*</sup> 補ケラス 400mg連日投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキサマ注(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(規格なし) :450ml/m <sup>2</sup> Day1	最小度
40	blo089	血液-内;MM_ <sub>[2-3]</sub> 目]scDBd療法【3週毎】	sc <sup>®</sup> ラツムツ <sup>®</sup> 1800mg/body day1,8,15,★ルツ <sup>®</sup> ミツ <sup>®</sup> 1.3mg/m <sup>2</sup> day1,4,8,11, デ <sup>®</sup> ツマツ <sup>®</sup> >80mg/week	ボルテゾミブ注射用3mg :1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A :1A Day1 Day4 Day8 Day11 (薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15	-
41	blo090	血液-内;MM_ <sub>[4-8]</sub> 目]scDBd療法【3週毎】	sc <sup>®</sup> ラツムツ <sup>®</sup> 1800mg/body day1,★ルツ <sup>®</sup> ミツ <sup>®</sup> 1.3mg/m <sup>2</sup> day1,4,8,11, デ <sup>®</sup> ツマツ <sup>®</sup> >80mg/week	ボルテゾミブ注射用3mg :1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A :1A Day1 Day4 Day8 Day11 (薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1	-
42	blo091	血液-内;MM_ <sub>[9]</sub> 目以降]scDBd療法【4週毎】	sc <sup>®</sup> ラツムツ <sup>®</sup> 1800mg/body day1, デ <sup>®</sup> ツマツ <sup>®</sup> >day1	(薬) ダラキユーロ配合皮下注:1V Day1	-
43	blo092	血液-内;NHL_polaRB療法【4週毎】	(DLBCL) day1RIT375mg/m <sup>2</sup> ,day2A <sup>*</sup> 51.8mg/kg,day2,3 A <sup>*</sup> >90mg/m <sup>2</sup> 【4週毎】※最大6回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ソル・コーテフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキサマ注(規格なし):375mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(規格なし) :337.5ml/m <sup>2</sup> Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL(HK):1本 Day2 Day3 デキサード注射液 3.3mg/mL/A:3A Day2 Day3 (薬) ポライビール点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day2 注射用水フソ-20ml :1A Day2 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg/4ml:90mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day2 Day3	中等度
44	blo094	血液-内;MM_ <sub>[2]</sub> 目]scDLd療法【4週毎】	sc <sup>®</sup> ラツムツ <sup>®</sup> 1800mg/body day1,8,15,22,ルツ <sup>®</sup> ミツ <sup>®</sup> 25mg,day1-21,DEX40mg/week	(薬) ダラキユーロ配合皮下注15ml/V:1V Day1 Day8 Day15 Day22	-
45	blo095	血液-内;MM_ <sub>[3-6]</sub> 目]scDLd療法【4週毎】	sc <sup>®</sup> ラツムツ <sup>®</sup> 1800mg/body day1,15,ルツ <sup>®</sup> ミツ <sup>®</sup> 25mg,day1-21,DEX40mg/week	(薬) ダラキユーロ配合皮下注15ml/V:1V Day1 Day15	-
46	blo096	血液-内;MM_ <sub>[7]</sub> 目以降]scDLd療法【4週毎】	sc <sup>®</sup> ラツムツ <sup>®</sup> 1800mg/body day1,ルツ <sup>®</sup> ミツ <sup>®</sup> 25mg day1-21,DEX40mg/week※PDまで	(薬) ダラキユーロ配合皮下注15ml/V:1V Day1	-
47	blo097	血液-内;MM_ <sub>[1-8]</sub> 目]PomVd療法【3週毎】	BOR1.3mg/m <sup>2</sup> day1,4,8,11,★ルツ <sup>®</sup> ミツ <sup>®</sup> 4mg/day day1-14,DEX20mg/day1,2,4,5,8,9,11,12	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」(ケルケイド後発):1.3mg/m <sup>2</sup> Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A :1A Day1 Day4 Day8 Day11	最小度

48	blo098	血液-内;MM_[9]-[目以降]PomVd療法【3週毎】	BOR1.3mg/ml day1,8,*初投4mg/day day1-14,DEX20mg/day day1,2,8,9	ボルネゾ注射用3mg「DSE P」(ヘルケイト後発):1.3mg/ml Day1 Day8 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8	最小度
49	blo099	血液-内;NHL_テコイケンシツ升入(ミト)療法【3週毎】	テコイケンシツ升入 (ミト) 9μg/kg 最大8回-日まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 (薬) レミト点滴静注用 300μg/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水フソ-20mL :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	-
50	blo101	血液-内-入;750_[2]-[目]scDCyBD療法【4週毎】	scダラキム 1800mg/body day1,8,15,22 CPA(内服)300mg/m/day1,8,15,22 *初投4mg 1.3mg/ml day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	(薬) ダラキム-口配合皮下注:1V Day1 Day8 Day15 Day22 ヘルケイト注射用 3mg :1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
51	blo102	血液-内;750_[3-6]-[目]scDCyBD療法【4週毎】	scダラキム 1800mg/body day1,15, CPA(内服)300mg/m/day1,8,15,22 *初投4mg 1.3mg/ml day1,8,15,22 DEX(内服)40mg/週	(薬) ダラキム-口配合皮下注:1V Day1 Day15 ヘルケイト注射用 3mg :1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL/A:1A Day1 Day8 Day15 Day22	-
52	blo103	血液-内;750_[7]-[目以降]scDCyBD療法【4週毎】	scダラキム 1800mg/body day1, DEX(内服)20mg day1	(薬) ダラキム-口配合皮下注:1V Day1	-
53	blo105	血液-内;MM_[2]-[目以降]IsaKd療法【4週毎】	イサキマ 10mg/kg day1,15, *初投4mg 56mg/m/day1,2,8,9,15,16, テコイケンシツ40mg/week	生食注250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 生食注100mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 Day22 Day23 (薬) カイロシ点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 (薬) カイロシ点滴静注用(規格なし) :56mg/ml Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 大塚蒸留水100mL :1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖注100mL/B:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16	-
54	blo106	血液-内NHL_FCM療法【4週毎】	※最大4回-	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラネトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day2 Day3 (薬) フルダラ静注用 50mg:25mg/ml Day1 Day2 Day3 注射用水フソ-20mL :1A Day1 Day2 Day3 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3 エンドキサン注(規格なし):200mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 50mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day2 Day3 (口座) ノントロン注 20mg/10mL/V:8mg/ml Day2 生食注 100mL (針なし) :1本 Day2	中等度
55	blo107	血液-内;AML_VEN + LDAC療法【4週毎】	[28日間] ※PDまで *初投400mg連日投与	キロサイド注(規格なし):20mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10	最小度
56	blo108	血液-内;NHL_polaR-THP-CP療法【3週毎】	※polaR-THP-CP療法は6回-日まで※7、8回-日はRITのみ PSLday3-7	生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day3 リル・コチフ注射用100mg/V (溶解液付) :1V Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 リツキシマ注(規格なし):375mg/ml Day1 大塚生食注 (規格なし) :337.5ml/ml Day1 グラネトロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day3 (薬) ポライビー点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day3 注射用水フソ-20mL :1A Day3 生食注 100mL (針なし) :1本 Day3 ビルピン注射用(規格なし):50mg/ml Day3 5%ブドウ糖注 100mL/B :1本 Day3 エンドキサン注(規格なし):750mg/ml Day3 生食注 250mL/袋:1袋 Day3	高度

57	blo109	血液-内;PTCL_ﾌﾟﾗﾄﾞﾘﾝｸﾞ療法【7週毎】	ﾌﾟﾗﾄﾞﾘﾝｸﾞday1,8,15,22,29,36 ※PDまで ★ﾊﾞﾙﾌﾞﾙ、ﾙﾝ、ﾙﾝ注、ﾙﾝ注 錠確認	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 (緊) ジフォルタ注射液 20mg/V:30mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36	軽度
58	blo110	血液-内;MM_Bd療法【3週毎】	BOR1.3mg/m/day1,4,8,11,DEX20mg/day day1,2,4,5,8,9,11,12 ※PD まで	ボルテゾミド注射液 3mg「DSE P」(ヘルケイド後発):1.3mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL/A:A:1A Day1 Day4 Day8 Day11	-
59	blo111	血液-内;PTCL_ｸﾞﾗﾝﾌﾟ療法【3週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ｸﾞﾗﾝﾌﾟ点滴静注 135mg:300mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用水フソ-20ml :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5	最小度
60	blo113	血液-内;CLL_【3-7-日目】ｶｷﾝｽ+ｶﾞｼﾞﾝ療法	【4週毎】※6J-ｽ ｶｷﾝｽ28日間 (1J-日目) ｶｷﾝｽ+ｶﾞｼﾞﾝ (2-7J-日目) ｶｷﾝｽ (8J-日目～)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ｶﾞｼﾞﾝ点滴静注 1000mg:1000mg Day1 生食注 250mL/袋:210ml Day1	最小度
61	blo114	血液-内;MM_【1J-日目】Isad療法【4週毎】	ｲﾝﾌﾗﾝﾏｼﾞﾝ 20mg/kg day1,8,15,22,DEX40mg day1,8,15,22,	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ﾃｷｻｰﾄ注射液 3.3mg/mL/A:12A Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 (緊) ｸﾞﾗﾝﾌﾟ点滴静注(規格なし):20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	-
62	blo115	血液-内;MM_【2J-日目以降】Isad療法【4週毎】	ｲﾝﾌﾗﾝﾏｼﾞﾝ 20mg/kg day1,15,DE40mg day1,8,15,22,	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 ﾃｷｻｰﾄ注射液 3.3mg/mL/A:12A Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 Day15 Day22 (緊) ｸﾞﾗﾝﾌﾟ点滴静注(規格なし):20mg/kg Day1 Day15 Day22 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22	-