

【肺がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 lun001	肺-内;AMR(40mg/mi)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day2 Day3 (緊) カルセド注(規格なし):40mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 Day2 Day3	中等度
2 lun002	肺-内;DTX(60mg/mi)療法【3週毎】	ドセタセル60mg/mi	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 ドセタセル点滴静注液「ニプロ」 (規格なし) :60mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	軽度
3 lun003	肺-内;CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 パクリタセル静注「ネル」(規格なし) :200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
4 lun004	肺-内;CBDCA+CPT-11療法【4週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 傾/ナ加塩酸塩点滴静注液「ト」(規格なし):60mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
5 lun005	肺-内;CBDCA+VP-16療法【4週毎】	CBDCA;AUC5	ソリアセトD輸液 500mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 生食注 50mL (針なし) :1本 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サト」 100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 Day2 Day3 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
6 lun006	肺-内;CBDCA+GEM療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし) :1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用「NK」 (規格なし):1000mg/mi Day1 Day8 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 Day8 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
7 lun007	肺-内;CBDCA+PEM療法【3週毎】	CBDCA;AUC5	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 アリムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
8 lun008	肺-内;Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 フモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 パクリタセル注「ネル」(規格なし) :200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用) :1本 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 アスチン点滴静注用 (規格なし) :15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1	中等度 (特定)
9 lun009	肺-内;CBDCA(AUC2)+PTX(40mg/mi)+RT療法【毎週】	CBDCA;AUC2 【放射線併用】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 パクリタセル注「ネル」(規格なし) :40mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 加味アミノ点滴静注液「日医工」 (規格なし) :AUC=2 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度

10	lun010	肺-内;CBDCA+S-1療法【3週毎】	CBDCA;AUC5 S-1;day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 加麻アライノ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=5 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1</p>	中等度 (特定)
11	lun011	肺-内;CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (紫) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加麻アライノ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1</p>	中等度 (特定)
12	lun012	肺-内;PEM療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	軽度
13	lun013	肺-内;PEM+CBDCA+Bmab療法【3週毎】	CBDCA;AUC6	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 加麻アライノ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 ベバシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	中等度 (特定)
14	lun014	肺-内;PEM+Bmab療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 ベバシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	軽度
15	lun015	肺-内;Bmab療法【3週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベバシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	最小度
16	lun016	肺-内;CDDP+CPT-11療法【3週毎】	小細胞肺癌...IP療法の日8,15のCPT-11単独投与【2投1休】	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 仰/加塩酸塩点滴静注液「トウ」(規格なし):60mg/mi Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8</p>	高度
17	lun021	肺-内;ニルマ*療法【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オプジーホ注(規格なし):240mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1</p>	最小度
18	lun022	肺-内;NGT療法【3週毎】	小細胞肺癌	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day3 (紫) ハイカムチン注射用1.1mg:1mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>	軽度

19	lun023	肺-内;RAM+DTX療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 トセチル点滴静注液「ニプロ」(規格なし):60mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	軽度
20	lun024	肺-内;A°Δ7°叫入°マ°療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
21	lun025	肺-内;A°Δ7°叫入°マ°+CBDCA+PEM療法【3週毎】	day1: A°Δ7°叫入°マ°(200mg/body)、加林°ア°マ° (AUC5)、アムタ° (500mg/mi) ※4コース後、維持療法	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 加林°ア°マ°点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度 (特定)
22	lun026	肺-内;A°Δ7°叫入°マ°+PEM療法【3週毎】	【維持療法】day1: A°Δ7°叫入°マ°(200mg/body)、アムタ° (500mg/mi) ※A°Δ7°叫入°マ°は導入療法と合わせて計35回	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 アムタ注射用(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	軽度
23	lun028	肺-内;A°Δ7°叫入°マ°+CBDCA+nabPTX療法【3週毎】	【扁平】A°Δ7°叫入°マ°:200mg/body(day1),nab-PTX:100mg/mi (day1,8,15),CBDCA(AUC6)(day1)※最大4コース→維持へ	生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 (緊)アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加林°ア°マ°点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 (緊)キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	中等度 (特定)
24	lun029	肺-内;ア°マ°マ°マ°療法【3週毎】	【進行再発NSCLC】[NSCLC adjuvant][ED-SCLCの維持療法]	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)デセントリク点滴静注 1200mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
25	lun030	肺-内;ア°マ°マ°マ°+Bmab+CBDCA+PTX療法【3週毎】	【非扁平】(day1)ア°マ°マ°マ°:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,PTX:175mg/mi,CBDCA:AUC6※最大4コース→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 ア°マ°マ°マ°点滴静注 200mg「日新」(希釈液不要):1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 (緊)デセントリク点滴静注 1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 バクシケル注「ネス」(規格なし):175mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加林°ア°マ°点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	中等度 (特定)
26	lun031	肺-内;ア°マ°マ°マ°+Bmab療法【3週毎】	【非扁平】(day1)ア°マ°マ°マ°:1200mg/body,Bmab:15mg/kg,※ 導入療法4-6コース後の維持療法	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)デセントリク点滴静注 1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブ点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
27	lun032	肺-内;ア°マ°マ°マ°+CBDCA+VP-16療法【3週毎】	【ED-SCLC】(day1)ア°マ°マ°マ°:1200mg/body,CBDCA:AUC5,(day1-3)VP-16 100mg/mi※4コース→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 (緊)デセントリク点滴静注 1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イトホシ点滴静注液100mg「サト」 100mg/5mL/V:100mg/mi Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加林°ア°マ°点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=5Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day2 Day3	中等度 (特定)

28	lun033	肺-内;テ`1M`療法【2週毎】	【地固め療法】デュリルマブ (day1) 10mg/kg ※投与期間は、初回投与から12ヶ月間まで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イミフンジ注(規格なし):10mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
29	lun034	肺-内;テ`1M`療法+CBDC+VP-16療法【3週毎】	【ED-SCLC】(day1)テ`1M`療法:1500mg/body, CBDC: AUC5, (day1-3)VP-16 100mg/mi ※4-1-1→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day2 Day3 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg[サト] 100mg/5mL/V:100mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 Day2 Day3 加糖ア`ヲ`点滴静注液[日医工](規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 500mL(針なし):1本 Day2 Day3	中等度(特定)
30	lun035	肺-内;テ`1M`療法1500療法【4週毎】	【進行再発NSCLC】【ED-SCLCの維持療法】	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 イミフンジ注(規格なし):1500mg Day1	最小度
31	lun036	肺-呼外;A`M`療法400療法【6週毎】	A`M`療法 400mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)キートルータ点滴静注 100mg/4mL/V:400mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
32	lun037	肺-内;RAM+EGFR-TKI療法【2週毎】	RAM 10mg/kg, EGFR-TKI (各々の添付文書どおり) ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)サイラムザ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1	最小度
33	lun040	肺-内;二`療法+化`療法【6週毎】	【NSCLC】【悪性中皮腫】day1,2二`療法 360mg/body, day1化`療法 1mg/kg ※PDまで、二`療法、化`療法は最長2年間まで投与可	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day22 (緊)ヤ`点滴静注 50mg/10mL/V:1mg/kg Day1 生食注 50mL(針なし):30ml Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 オブジーホ注(規格なし):360mg Day1 Day22 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day22	最小度
34	lun041	肺-内;二`療法480療法【4週毎】	(day1)二`療法 480mg ※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 オブジーホ注(規格なし):480mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
35	lun043	肺-内;(short) `療法+CDDP+GEM療法【3週毎】	【扁平】※最大4-1-1→維持療法(`療法`単独)へ ★年齢、PS、腎機能、心機能、1L/日以上の飲水可能を確認。	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 (緊)ホ`点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8 生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 Day8 M`点滴静注液 0.75mg/50mL[サト] (70特後発):1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day8 生食注 50mL(針なし):1本 Day8 ゲムシタピン点滴静注用[NKJ](規格なし):1250mg/ml Day1 Day8 生食注 100mL(針なし):1本 Day1 Day8 ラクテック注 500mL/袋:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:8ml Day1 シスプラチン注「マルコ」(規格なし)(後発品):75mg/ml Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 フロセミド注「トー」 20mg/2mL/A:1A Day1 20%マンニトール注射液「YD」 300mL:1袋 Day1 KN3号輸液 500mL:1袋 Day1	高度

36	lun044	肺-内;シタムマブ維持療法【3週毎】	※シタムマブ + CDDP + GEM療法4コース後の維持療法、PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 (緊) ポートラザ点滴静注液 800mg/50mL:800mg Day1 Day8 生食注 250mL/袋:0.8袋 Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8	最小度
37	lun046	肺-内;nabPTX療法【3週毎】	※PDまで	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 (緊) アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15	軽度
38	lun047	肺-内;アテゾリチン+CBDC+nabPTX療法【3週毎】	【非扁平】※最大4-6コース→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味アテゾ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15	中等度 (特定)
39	lun048	肺-内;VNR(2投1休)療法【3週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 Day8 ロゼウス点滴静注(規格なし):25mg/mi Day1 Day8	最小度
40	lun049	肺-内;トシムマブ+テシムマブ+CBDC+nabPTX療法	【非扁平】※最大4-6コース→維持療法へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 Day15 生食注 50mL (針なし):4本 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg (特生物):100mg/mi Day1 Day8 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day8 Day15 加味アテゾ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イジユド点滴静注 25mg/1.25mL:75mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)
41	lun050	肺-内;トシムマブ+テシムマブ+CBDC+PEM療法	【3週毎】【非扁平】※4コース→トシムマブ+テシムマブ±PEM療法へ	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ペントレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):2本 Day1 加味アテゾ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 イジユド点滴静注 25mg/1.25mL:75mg Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1	中等度 (特定)
42	lun051	肺-内;トシムマブ+テシムマブ療法	トシムマブ+テシムマブ療法1コース投与→テシムマブ1500療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 Day29 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 Day29 生食注 50mL (針なし):1本 Day29 イジユド点滴静注 25mg/1.25mL:75mg Day29 生食注 100mL (針なし):1本 Day29	最小度
43	lun052	肺-内;トシムマブ+テシムマブ+PEM療法	【非扁平】※トシムマブ+テシムマブ±PEM療法1コース投与→テシムマブ±PEM療法【4週毎】へ	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day29 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 生食注 50mL (針なし):3本 Day29 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 Day29 ペントレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/mi Day1 Day29 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day29 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1 Day29 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day29 イジユド点滴静注 25mg/1.25mL:75mg Day29 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day29	軽度
44	lun053	肺-内;テシムマブ+PEM療法【4週毎】	【非扁平】※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 ペントレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 イミフィンジ注(規格なし):1500mg Day1	最小度
45	lun054	肺-呼外;【術前】ニルマチン+CBDC+PTX療法【3週毎】	【非小細胞】(day1)ニルマチン:360mg/body,PTX:200mg/mi,CBDC:AUC6※最大3コース	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 フアモチジン静注 20mg「日新」【希釈液不要】:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:6A Day1 パクリタキセル静注「北薬」(規格なし):200mg/mi Day1 生食注 500mL/袋(点滴用):1本 Day1 加味アテゾ点滴静注液「日医工」(規格なし):AUC=6 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 オブジーホ注(規格なし):360mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1	中等度 (特定)

46	lun055	<p>肺-呼外;【術前】ニルセチン+CBDCA+PEM療法【3週毎】</p>	<p>【非小細胞】(day1)ニルセチン:360mg/body,PEM:500mg/mi,CBDCA:AUC5※最大3回-ス</p>	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL〔HK〕:1本 Day1 デキサード注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 (禁) ヘトレキセド点滴静注液(規格なし):500mg/ml Day1 生食注 100mL (針なし) :2本 Day1 加藤アミノ点滴静注液〔日医工〕(規格なし) :AUC=5 Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 オブジーボ注(規格なし):360mg Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1</p>	<p>中等度 (特定)</p>
----	--------	--	--	---	---------------------