

【大腸がん(外来)】

最終更新令和5年11月

当院コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
1 col001	大腸-内;Pmab療法【2週毎】	パニマラブ：6mg/kg 2週毎	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)ペクテビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1	最小度
2 col002	大腸-内;CPT-11療法【2週毎】	CPT-11 150mg/m ²	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 レバチン塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注500mL (シフト) :1本 Day1	中等度 (特定)
3 col003	大腸-外;mFOLFOX6療法【2週毎】	1ヶ-14日間【day1,15,29...】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レバチン点滴静注用 (規格なし) :200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :400mg/m ² Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
4 col004	大腸-外;mFOLFOX6+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブ BS点滴静注用 (規格なし) :5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レバチン点滴静注用 (規格なし) :200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :400mg/m ² Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
5 col005	大腸-外;mFOLFOX6+Pmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (緊)ペクテビクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レバチン点滴静注用 (規格なし) :200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :400mg/m ² Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
6 col007	大腸-外;【2ヶ-1目】mFOLFOX6+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 (緊) アービタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/m ² Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし) :85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 レバチン点滴静注用 (規格なし) :200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :400mg/m ² Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度
7 col008	大腸-外;FOLFIRI療法【2週毎】	1ヶ-14日間【day1,15,29...】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 レバチン塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 レバチン点滴静注用 (規格なし) :200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :400mg/m ² Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)
8 col009	大腸-外;FOLFIRI+Bmab療法【2週毎】		生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベシズマブ BS点滴静注用 (規格なし) :5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし) :1本 Day1 グラニセロン点滴静注(バッグ)1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 レバチン塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/m ² Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 レバチン点滴静注用 (規格なし) :200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖注250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :400mg/m ² Day1 生食注 50mL (針なし) :1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし) :2400mg/m ² Day1 生食注 100mL (針なし) :100ml Day1	中等度 (特定)

9	col010	大腸-外;FOLFIRI+Pmab療法【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 (紫)ベクテイピクス点滴静注(規格なし):6mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 イリナカ塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/mi Day1 i^hナ^hナ^h点滴静注用 (規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
10	col012	大腸-外;【2 nd -目】FOLFIRI+Cmab療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 Day8 (紫)アベピタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/mi Day1 Day8 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day8 イリナカ塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 i^hナ^hナ^h点滴静注用 (規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
11	col013	大腸-外;FOLFIRI+RAM療法【2週毎】	day1 RAM 8mg/kg,,CTP-11 150mg/m2,5-FU 400mg/m2,5FU 2400mg/m2	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 (紫)サイラムザ点滴静注液(規格なし):8mg/kg Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 イリナカ塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 i^hナ^hナ^h点滴静注用 (規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
12	col014	大腸-外;FOLFIRI+「ナ ^h ナ ^h 」療法【2週毎】		<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 ザルトラップ(規格なし):4mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 イリナカ塩酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/mi Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1 i^hナ^hナ^h点滴静注用 (規格なし):200mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):400mg/mi Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):2400mg/mi Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1</p>	中等度 (特定)
13	col015	大腸-外;XELOX(CapeOX)療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1</p>	中等度
14	col016	大腸-外;XELOX(CapeOX)+Bmab療法【3週毎】	Capecitabine:day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベ(シズマブ)BS点滴静注用 (規格なし):7.5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1</p>	中等度
15	col018	大腸-外;SOX+Bmab療法【3週毎】	S-1:day1-14	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 ベ(シズマブ)BS点滴静注用 (規格なし):7.5mg/kg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 グラニセロン点滴静注/バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL (ソフト):1本 Day1</p>	中等度
16	col019	大腸-外;D ^h ナ ^h +Bmab療法【4週毎】	A ^h ナ ^h マ ^h 5mg/kg (day1、15) D ^h ナ ^h day1-5,8-12	<p>生食注 250mL/袋:1袋 Day1 Day15 ベ(シズマブ)BS点滴静注用 (規格なし):5mg/kg Day1 Day15 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 Day15</p>	中等度

17	col022	大腸-外;肝転移WHF+CDDP療法【weekly】	★肝動脈注 CDDP (20mg/body) + 5-FU (1000mg/m2)	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 シスプラチン注[マルコ](規格なし):20mg Day1 生食注 100mL (針なし):1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):1000mg/m Day1 生食注 500mL/袋 (点滴用):1本 Day1	中等度に 準ずる
18	col023	大腸-外;5FU/LV療法	【1サイクル56日間6投2休】 day1,8,15,22,29,36 5FU600mg/m2, LV250mg/m2 【アミノ酸は全3サイクル】	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):250mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):600mg/m Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1	軽度
19	col025	大腸-外;【②-】Cmab+ヒト抗HER2療法【毎週】	Cmab 250mg/m day1,1週間1回300mg1日1回連日, ヒト抗HER2 1回45mg1日2回連日	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/m Day1	軽度
20	col026	大腸-外;★Cmab+ヒト抗HER2療法【2週毎】	Cmab 500mg/m day1,1週間1回300mg1日1回連日, ヒト抗HER2 1回45mg1日2回連日 ※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL (針なし):1本 Day1 アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/m Day1	軽度
21	col027	大腸-外;FOLFIRI+Cmab500療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること ※PDまで	生食注 250mL/袋:3袋 Day1 グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/m Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 リナカニル酸塩点滴静注液[SUN](規格なし):150mg/m Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):200mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1 フルオウラシル注 (規格なし):400mg/m Day1 フルオウラシル注 (規格なし):2400mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1	中等度 (特定)
22	col028	大腸-外;mFOLFOX6+Cmab500療法【2週毎】	RAS遺伝子野生型であること※PDまで	生食注 250mL/袋:2袋 Day1 グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL[HK]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 アーピタックス注射液 100mg/20mL/V:500mg/m Day1 生食注 50mL (針なし):2本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液 (規格なし):85mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:2本 Day1 レキソト点滴静注用 (規格なし):200mg/m Day1 フルオウラシル注 (規格なし):400mg/m Day1 フルオウラシル注 (規格なし):2400mg/m Day1 生食注 100mL (針なし):100ml Day1	中等度 (特定)