

悪性リンパ腫でPola+R-THP-CP療法を受けられる方へ（クリティカルパス）

患者様用

（ ） 様

主治医 （ ）

経過（病日）	入院日	治療当日	治療2日目	治療3日目	治療4～9日目	治療10日目（退院日）
月/日	/	/	/	/	/ ~ /	/
達成目標	・治療を受ける意志がある	・パ・イクルシンが安定している ・治療がスムーズに終了する	・パ・イクルシンが安定している	・パ・イクルシンが安定している ・治療がスムーズに終了する	・パ・イクルシンが安定している ・問題となる副作用（激しい吐き気やひどい下痢・便秘など）が出現しない	・問題となる副作用が出現せずに退院できる。
食事（栄養）	基本食2（状態に合わせて変更可能）	⇒	⇒ 	⇒	・食事に合わせて食事変更を行います。 ・必要時には管理栄養士が介入させていただきます。	⇒
治療・注射 ※点滴している方の腕は出来るだけ伸ばした状態を保ってください。	腕から点滴を入れるところを確保します。	点滴をします。 ①ソル・コーテフ ②リツキシマブ の点滴を行います。		点滴をします。 ①グラニセトロン ②ポライビー ③オンコビン ③ビノルビン ⑤エンドキサン の点滴を行います。	皮下注射をします ①フィルグラスチム	退院の前に皮下注射をします。 ①フィルグラスチム
内服	現在内服中のお薬がある方はお知らせ下さい	アレルギーを抑える薬を9時30分ごろに飲みます。 （レスタミンコ-7錠 5錠）		治療のための薬（プレドニソルロン錠）や胃薬（777錠）を5日間飲みます。	⇒ 	
安静・排泄	制限はありません。	点滴中トイレ以外は安静です。 トイレ使用後は2回水を流してください（6日間）。	制限はありません。	点滴中トイレ以外は安静です。	制限はありません。	⇒
清潔	制限はありません。	治療日シャワー浴はできません。 体拭きは可能です。	制限はありません。	治療日シャワー浴はできません。 体拭きは可能です。	制限はありません。	⇒
説明・指導	入院診療計画書や入院中のクリティカルパスの説明をします。 ★薬剤師が、お薬の説明をします。	点滴中体が痒い・気分が悪いなどの症状がある時や、点滴刺入部が痛い時はお知らせ下さい。		点滴中気分が悪いなどの症状がある時や、点滴刺入部が痛い時にはお知らせ下さい。	入院中に管理栄養士による食事指導があります。	退院指導（感染予防行動、必要時内服指導）を行います。 次回の受診日について説明をします ★薬剤師がお薬の説明をします。

状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたらご質問下さい。

宮崎県立延岡病院 5東病棟

（2024年11月改定）